

醫國學入門

七卷下

#1336609111
v. 15

編註醫學入門

七卷下

通用古方詩括

百十

急救諸方

百十

恠疾

百北
治法

百北

水火分治

百北

標本分治

百北
標本論


百北

求本論

百北

雜治賦

百北
習醫規格



通用古方詩括

此等方如文家程式不可不記以為

合摘變而通之加者本方外加別藥一二味減者

本方內減去一二味穿者如四君子湯穿四物湯

二陳湯二三方穿而為一或有去取合者如四君

子湯合四物湯更無去取摘者如用四君子湯有

痰摘二陳湯中陳皮半夏血虛摘四物湯中當歸

或地黃二味血虛頭痛摘川芎一味血虛腹痛摘

芍藥一味千方萬方在藥皆然知此則處方有骨

正東垣所謂善用方者不執方而未嘗不本於方

也凡詩括內方無等分者

悉見各門總方及用藥賦

傷寒

麻黃湯中用桂枝杏仁甘草四般兒發熱惡寒身體痛須

知

一服汗淋漓

見三卷百二葉

桂枝湯內藥三般為藥甘草一處攪若把二方相合服方

桂枝各半湯治傷寒見三卷

九味羌活湯防風黃芩白芷與川芎蒼朮生地細辛草煎

法還用姜棗葱見三卷

大羌活湯即九味已獨知連朮相助一十四般白水煎兩

感風寒瀉此治見三卷

香蘇散即君香蘇甘草陳皮各半咀無汗麻黃宜量入腦

痛芎芷不可無見三卷

升麻葛根湯四味攪上方藥甘草是傷寒發熱與頭疼汗

出惡寒風熱治見三卷

十神湯內紫蘇多甘草陳皮香附顯乾葛升麻并芍藥川

芎白芷麻黃和見三卷

古蒼荆散藥相等甘草減半性不猛未發熱時宜急煎感

冒風寒濕可省

又名神和散蒼朮荆芥各等分甘草減半水煎溫服治感冒寒濕身體沉重肢

節痠疼項背拘急鼻塞聲重氣壅上成咽渴不利等症

消風百解

散

荆芥芷陳皮麻黃蒼朮比甘草攪成姜葱煎

頭疼發熱咳嗽使

荆芥蒼朮白芷陳皮麻黃各八分甘草四分姜葱煎服治四時傷寒頭疼

發熱鼻塞聲重如咳嗽加烏梅

參蘇飲內用陳皮桔梗前胡半夏宜乾葛茯苓同甘草水

香枳壳總堪題

見三卷
七八葉

大青龍湯桂麻黃甘草杏仁石羔藏生姜棗子煎熱服惡

寒無汗用爲良

見三卷
六九葉

小青龍湯治喘嗽姜桂麻黃細辛湊半夏五味爲藥甘心

胃水氣自然透

見三卷
七四葉

白虎湯中用石羔甘草知母本方抄个參亦有加之用熱

渴虛煩用米熬

見三卷
百十三

竹葉石羔湯用參門冬半夏更加臨甘草生姜兼用米虛

寒自利熱家尋

見三卷
七六葉

黃連解毒湯四味黃柏黃芩梔子是退黃解熱又除煩吐

血便紅皆可治見三卷

人參敗毒散桔梗甘草川芎茯苓等枳壳前胡羌獨活柴

胡十味性涼冷見三卷

瓜蒂散中赤小豆二味勻平有傳授豆豉一合水同煎吐

去膈痰瀕此救見三卷

小柴胡湯只五般半夏人參一匙攢更有黃芩與甘草加

小減由入効百端見三卷

大柴胡湯用大黃半夏枳壳此為良更有黃芩赤芍藥姜

大棗煎來利大腸見三卷

小承氣湯枳朴黃結胃謔語煎之掌三化湯只加羌活中

風竅閉効非常三化湯即本方加羌活等分水煎服利中風九竅俱開唇緩舌強

大承氣湯用朴硝太黃等分不須饒厚朴倍加并枳殼通

腸利便有功勞二方見三卷百九葉

桃仁承氣五般奇甘草硝黃并桂枝血症發黃并血竭熱

泄亂語總相宜見三卷七七葉

四逆湯中姜一兩生附減半去皮尖二兩甘草水煎服厥

而下利用之痊見三卷百十五

理中湯用甘草姜白朮人參是泛常若是內中加附子更

名附子理中湯

見三卷百十四

小建中湯方藥三生姜附子一分參更有枝枝一两半膠

飴大棗治虛寒

見三卷百十五

玄武湯中方藥魁茯苓白朮甘草煨附子炮來加減用生

姜五片陽可回

見三卷百十五

灸甘草湯參阿膠麥門生薑太棗饒生地黃麻子仁桂入

些酒煮治虛勞

見三卷百十六

內傷

補中益氣黃芪參甘草白朮當歸身柴胡升麻陳皮伴形

勞虛損喘背併

見三卷百三十一

升陽益胃參朮芪黃連半夏草陳皮澤瀉防風羌獨活柴

胡白芍也堪題

見三卷百卅一

益胃升陽當歸身參朮苓芪麴炒陳甘草升麻柴胡使秋

間服者去黃芩

見三卷百卅六

調中益氣橘升麻甘草柴胡蒼朮加黃芪木香參八味從

前選用也堪誇

見三卷百卅二

升陽補氣湯升麻澤瀉防風白芍誇厚朴柴胡羌獨活甘

草地黃生用佳

升麻澤瀉防風白芍羌活獨活甘草各五分厚朴一分柴胡一錢二分生地七

分半、葦葉煎服。治飲食不時、饑飽勞後、胃氣不足、脾氣下溜、氣短無力、不能寒熱、早飲後昏悶、怠惰、四肢不收、懶於動作、五心煩熱、如腹脹及腹窄、快加厚朴、腹中硬加砂仁。

雙和散 桂甘草方 黃芪參歸熟地黃 姜棗煎來補氣血虛

勞少食也 堪嘗 見三卷百廿二

升陽散火湯 升麻葛根柴胡防風加炙草人參羌獨活生

甘芳藥總堪 見三卷百廿二

通關細辛皂角等入鼻須看有嚏否去辛加平或加礬方

名急救 稀涎散 通關散細辛皂角等分爲末吹入鼻內治中風不省牙關緊急用此有嚏可治

無嚏者死 稀涎散皂角半夏明礬各等分爲末每二錢白湯調服即吐治中風肢散涎潮膈塞氣閉不通

烏藥順氣散 陳皮姜枳壳姜蠶芎芷詳甘草麻黃桔梗入

中風先服最為良 烏藥陳皮各一錢乾姜二分半枳壳
姜蠶川芎白芷桔梗甘草各五分麻

黃一錢半姜棗煎溫服治男婦一切風氣攻注肢節疼
麻癱瘓言語蹇澁先服此疎氣道然後進以風藥氣升

為逆降下為順順氣者正所謂降氣也如陰積浮腫合
五續散麻痺痛極合二五七散二三年不能行者合獨

活寄生湯日夜
疼痛合左經湯

祛風通氣散 烏藥君芎芷甘梗橘木臣麻壳人參為佐使

姜棗煎來任屈伸 烏藥一錢半川芎白芷甘草桔梗陳
皮白木各一錢麻黃枳壳人參各五

分姜棗煎服或為末每二錢紫蘇木瓜煎湯調服搔痒
加薄荷少許治男婦氣虛內風攻注或外風中藥頭目

昏痛鼻塞口喎語澁甚則身如板片攣拳屈伸不便肩
背刺痛胃脇膨脹脚膝軟弱痰多咳嗽嘔吐惡心吐瀉

不食胎前產後一切虛風等症

星香散內炮南星更有木香生用靈若加川烏與附子方

名改換號三生

星香散南星四錢木香五分姜一片水煎熱服治中風痰盛服熱藥不得者

三生飲南星二錢川烏附子各一錢木香五分姜十片

水煎溫服治中風昏迷痰涎壅併口服咽斜半身不遂

脉沈無熱者可服

去川烏名星附湯

資壽解語湯

附子風天麻酸棗桂羊充甘草羌活次第入

竹瀝多湊立奇功

附子防風天麻酸棗仁各三分官桂

水煎入竹瀝調服治風中

心脾舌強不語半身不遂

小續命湯防已桂杏仁黃芩芍藥配甘草參芍與麻黃附

子防風一同例

防已肉桂杏仁黃芩芍藥甘草人參川

羌活

獨活

各一錢附子五分防風一錢半

羌活煎服治卒暴中風不省人事漸覺半身不遂口眼

喎斜手足顫掉語言蹇澀肢體麻痺精神昏亂頭目眩

暈痰壅筋攣骨節煩疼又治脚氣緩弱及久病風人每

遇天色陰晦筋脈變更宜預服之以防瘖啞如有不經

見症加戒照依傷寒無汗惡寒合麻黃湯有汗惡風合

桂枝湯身熱無汗合白虎湯有汗合葛根湯身涼無汗

合古姜附湯有汗合古桂附湯無此四症少陰厥陰肢

節攣痛麻木用本方八錢加羌活四兩連翹六兩為丸

服亦

交濟湯

即本方合排

排風湯木桂苓芎杏方甘麻與防風獨活當歸白鮮佐稀

延治搖最多功

白木肉桂川芎杏仁芍藥甘草防風當

歸各五十分茯苓麻黃獨活各七分半白

鮮皮二分半姜煎溫服治男婦中風及風虛卒濕邪氣

入於五臟令人狂言妄語精神錯亂以至手足不仁痰

涎壅盛此湯安心定志聰耳明目
大理榮血去肝邪服有微汗不妨

大秦朮湯羌獨活芎芷甘草兩地黃歸芍苓防白朮石

羔十六味平良

秦朮石羔各一錢半羌活獨活川芎白芷甘草生地熟地當歸白芍黃芩茯苓

防風白朮各一錢細辛二分半水煎溫服治中風內外
無症知為血弱不能榮筋手足不能運動舌強不能言
宜養血而筋自榮如天陰雨加生姜心下痞加枳實

羌活愈風

湯

草參芪防風蔓細枳朮皮麻菊薄荷拘獨芷

芎歸杜仲柴前知生熟地黃半朴桂苓苓芍朮已羔依

羌活甘草人參黃芩防風蔓荊子細辛枳朮秦朮地骨
皮麻黃其菊花薄荷枸杞子獨活白芷川芎當歸杜仲
柴胡前胡知母熟地半夏厚朴防己各五分生地石羔
蒼朮各一錢肉桂二分半芍藥黃芩茯苓各七分半水

煎遇天陰生薑三片煎空小溫服治肝腎虛筋骨弱語
言難精神昏瞶及風濕體重或瘦而一肢偏枯或肥而
半身不遂或恐而健忘喜已多思皆精不足也宜此安
神養心調陰陽不問男婦小兒風癰急慢驚風神效

萬寶回春湯其奇甘麻冬已杏仁依生地熟地芍歸芍黑

附香附沈半皮茯神參朮防風桂烏藥川烏姜黃芪

防風通聖將軍方薄荷芍歸草朴硝梔翹芩梗并白木麻

黃荊芥滑石

見三卷
七一葉

頭痛

川芎茶調散薄荷白芷防風甘草和更有細辛羌活等荊

芥同煎用者多

川芎荊芥各四兩薄荷白芷甘草羌活
各二兩防風一兩半細辛一兩為末每

二錢茶清調服治諸風上攻頭

目昏重偏正頭疼鼻塞聲重

消風散用荆芥參甘草陳皮白茯苓姜蠶豆窮防風藿蟬

退厚朴羌活停

荆芥甘草各二兩人參茯苓姜蠶川芎防風藿香蟬退羌活各一兩陳皮厚朴

各五錢為末每二錢感風頭痛鼻流清涕荆芥煎湯下

瘡癰溫酒下治諸風上攻頭目昏眩項背拘急鼻塞聲

重耳鳴及皮膚頑麻疹痒婦人血風頭皮腫痒又治眼

胞皮肉有似膠疑腫如桃李時出熱淚及偏風牽引兩

臉赤爛經年不

安風眼要藥也

三五七散山茱萸姜附細辛防茯苓每服二錢溫酒下風

寒入腦致陽虛

附子細辛各三兩山茱萸炮乾姜各五兩防風茯苓各七兩一方無茯苓有山

藥五兩為末每二錢酒調服治陽虛風寒入腦頭痛目

眩運轉耳內蟬鳴一切風寒濕痺脚氣緩弱及今風五

痺肢體不

仁等症

山茱萸散甘菊花人參山藥茯神遮小苧六味各五錢治

眩暈轉實堪誇山茱萸一兩甘菊花人參山藥茯神小苧各五錢為末每二錢茶清或酒調服治

風眩頭暈有山効

羌吳湯麻藁升芪黃柏芩連與苧歸細蔓紅花蒼朮半頭

頂項痛即時移黃芩黃柏各二錢蒼朮一錢羌活麻黃吳萸四分藁本升麻黃芪各二分當歸

川芎蔓荊子細辛黃連半夏紅花各一分水煎溫服治厥陰頭項痛或痰涎厥冷脉浮而緩

升麻胃風葛芷蒼柴藁蔓歸草蔻羌甘栢麻黃姜棗煮能

消面腫與牙疳見六卷第五葉

明目流氣飲大黃芩辛牛蒡菊花防芥蔓疾玄甘木賊決

明施子與參蒼

大黃川芎細辛牛蒡子甘菊防風白蒺藜荆芥蔓荊子玄參甘草木賊黃芩山

梔各一兩草決明一兩半蒼朮二兩為末每二錢臨臥冷酒調服治肝經不足風熱上攻視物不明常見黑花當風多淚隱澁難開或生翳障婦人血風時行暴赤一切眼疾並宜服之

洗心散用麻大黃白朮當歸芍藥涼荊芥穗同甘草等姜

薄加上水煎湯

麻黃大黃當歸芍藥荊芥甘草各八分白朮一分半生薑薄荷各少許水煎服

治風痰壅滯心紐積熱口苦唇燥二便秘澀眼睛腫痛多淚羞明並皆治之

洗肝散用薄荷葉當歸羌活山梔仁大黃防風甘草等川

芎治眼効如神

各等分為末每二錢熱水調服治風毒上攻暴赤腫痛隱澁淚等症

川芎石燕散歸朮參梔大黃寒水石滑菊荊參草梗砂防

翹薄荷葉煎熟

川芎芍藥當歸山桅黃芩大黃菊花荆芥人參白朮各五分滑石四錢寒水石

桔梗各二錢甘草二錢石羔防風連翹薄荷各一錢砂

仁二分半水煎溫服忌姜醋發熱物治風熱上攻頭目

昏眩痛悶風痰喘嗽鼻塞口瘡煩渴淋閉服生翳膜此

藥清神爽志宜通氣血又治中風偏枯解中外諸邪謂

理諸病勞

復傳染

還睛散用白蒺藜草決木賊與山桅防甘蟬退青柏子為

末門冬湯下之

蒺藜甘草木賊防風山桅各一錢草決一兩青柏子蟬退各二錢半為末每

二錢麥門冬煎湯下治肝肺一切風熱翳膜及腎風熱

或睛忽痛如針刺或小兒痘眼初起淋痛久則生翳

腫淚出難開一切肝風及瀉利後虛熱上

衝不可點者並宜服之為眼科通用之藥

蟬花散即還睛散加上荆芥草龍膽蔓荳芎菊各均平茶

清調下昏翳展

白茯苓甘草木賊防風山桅草決明青柏子蟬退川芎荆芥蔓荆子蕃蒙花菊

花草龍膽各等分一方無青柏龍膽有穀精草羌活黃

芩等分爲末每二錢茶清或荆芥煎湯調服治脉經蘊

熱毒氣上攻眼目赤腫昏翳

多淚羞明一切風毒並宜

四物龍膽湯地黃川芎芍藥當歸良防風防已草龍膽服

疼食後水煎嘗

當歸川芎赤芍生地各一錢防風六分草龍膽防已各四分水煎溫服治目赤

暴發雲翳疼

補陽八物除川芎黃芪羌獨活防風澤瀉陳榮知母桂

空心煎服効非常

見六卷第十葉

犀角升麻湯白芷防風川芎白附子甘草羌活與黃芩風

熱牙疼皆可使

犀角七分半升海防風羌活川芎白芷黃芩白附子各五分甘草一分半水煎

漱服治

胃經風毒氣血凝滯麻痺不仁鼻額間痛唇口

頰車發際連牙腫痛口不能開須言語飲食亦妨碍左

額頰上如糊細

急手觸之則痛

獨活散內用川芎羌活荆防薄荷成生地黄兼細辛使煎

來漱嚥治牙齦

獨活川芎羌活防風各五分荆芥薄荷生地細辛各二分水煎漱服治風毒攻

注牙齦

腫痛

甘露兩地山茵陳天麥枇杷枳殼芩石甘等分煎之用

男婦咽牙客熱靈

生地黄熟地黃茵陳天門冬麥門冬枇杷葉枳殼黃芩石斛甘草各等分

水煎服治胃中客熱咽腫乾燥牙宣

齰腫或身黃如疸等症用之如神

通氣防風湯 羌獨君藁本荆芎甘五分 鬱加升柴寒蒼栝

大陽脊強痛堪均

防風羌活獨活各一錢藁本藁本荆子川芎甘草各五分水煎溫服治手足

太陽經氣鬱不通有背痛不可回顧者痛項強腰必折頭似拔如身重腰沉沉然者經中有寒濕也加酒浸防已輕加附子重加川烏各一錢有鬱加升柴柴胡有濕熱加蒼朮黃柏各五分

活絡湯用羌獨治芎歸白朮甘草嚼姜煎一盞不拘時風

濕臂痛勝諸藥

羌活獨活川芎當歸白朮甘草各一錢半姜煎溫服治風濕臂痛諸藥不効者

舒經湯中姜黃最歸草栝朮共切碎赤芍羌活又少些沈

香磨服治諸痛

姜黃五錢當歸甘草海桐皮白朮各二錢半赤芍羌活各一錢二分半分二貼

姜煎入沈香少許腰已上痛食後腰已下痛食前服治氣血凝滯經絡以致臂痛不舉及諸痛風針灸不効者

痺風

五痺湯中羌白朮姜黃防已二錢足甘草一錢姜同煎筋

緩皮頑堪耳續名之羌活白朮姜黃防已各一錢甘草一錢方有柴胡姜煎熱服治風寒濕氣客

留肌體手足緩
胃頑麻不仁

三痺湯即寄生湯黃芪續斷湊成方一切風痺拘攣疾煎

服為九任意嘗杜仲牛膝細辛人參茯苓桂心白芍

活秦艽生地各五分姜棗煎熱服
治血氣滯滯手足拘攣風痺等疾

黃芪湯治渾身麻蔓草橘參為藥返臨卧水煎還滾服大

熱三分黃柏加黃芪人參芍藥各一錢蔓荊子四分橘

附背腿脚或遍身麻木不
仁及兩目羞明隱澁睛痛

補氣湯黃芪白芍甘草澤瀉陳皮搏水煎能治皮膚麻兼

醫眼自多昏錯

白芍陳皮各一錢半黃芪甘草各一錢澤瀉五分水煎溫服治肝氣不行皮膚

間麻木兼治兩目縮小

羞明畏日視物無力

感寒

五積白芷陳皮朴桔梗枳壳川芎芍甘草蒼木茯苓歸半

夏桂姜麻黃著熟料去麻加土烏

藥除正桂外醋炒略

五積散白芷川芎芍藥甘草茯苓當歸肉桂各二分陳皮麻黃各六分厚朴藁本各四分桔梗一分半枳壳五分半夏二一分蒼木七分半姜葱煎服胃寒用濃姜如腹痛或挾氣加吳茱調經入艾醋醃體薄有汗去蒼木麻黃氣虛去枳梗加參木若產後餘血流入遍身肢節腰脚疼痛去麻黃加人參木瓜桃仁小茴姜煎此方大治感冒寒邪頭疼身痛頭強拘急惡寒嘔吐腹痛及傷寒發熱頭疼惡風內傷生外感風寒并寒濕客于經絡腰

脚痠疼及婦人經脈不調及腹上痛帶下等症

熟料五積散

即本方除白芷肉桂二味外餘

十三味用慢火炒令色變攤冷入桂芷和勻產後寒熱去麻黃用烏藥一錢俱用淡醋炒過尋常冬月感寒無牙量用麻黃同諸藥乾炒半身不遂或復麻痺及卒中風加麝少許四肢逆冷嘔吐加附子二分久虛脾瀉每用畧炒過加陳米一撮烏梅一箇乳麝初作加牛膝生地各二分產後及尋常血氣痛加木香玄胡索各五分

藿香正氣用紫蘇大腹陳皮桔梗咀甘草茯苓半夏麴厚

朴白芷棗姜扶

見三卷

又不換金正氣散蒼陳朴半藿甘六傷濕須加白茯苓汗

多去蒼換白米

見三卷

神木散用三兩蒼芎芷細辛藁本羌甘草六件各一兩風

寒泄痢總相當

倉朮五兩川芎白芷細辛藁本羌活甘草各一兩每三錢姜葱煎溫服傷風鼻

塞為末葱白茶清調下

治四時感冒風寒及中露露頭

咳
疼項強寒熱身痛鼻塞聲重咳嗽特行發泄下痢甘効

金沸草散麻甘芍荆芥前胡半夏姜肺受風寒頭目痛咳

嗽聲粘時疫方

見三卷八十三葉

蘇沈九寶

飲薄荷陳麻桂桑蘇與杏仁大腹皮同甘草入

諸般咳嗽効如神

薄荷陳皮麻黃官桂桑白皮紫蘇杏仁太腹皮甘草各等分生薑烏梅煎

服治諸般咳嗽

哮喘夜不得卧

發明半夏溫肺湯細辛桂心旋覆花甘草陳皮參桔梗芍

藥茯苓赤者佳

半夏細辛桂心旋覆花甘草陳皮人參桔梗芍藥各五錢赤茯苓三分每四錢

姜煎溫服治虛寒咳嗽及中脘痰水冷氣心下汗洋喘雜多唾清水胸脹不食脉沈弦細遲此胃虛冷所致也

參清肺飲烏梅桑地骨皮知母培阿杏桔梗甘壘栗加

蜜澄清得効來人參烏梅桑白皮地骨皮知母阿膠桔梗甘草壘栗壳杏仁等分棗煎入蜜一

匙澄清溫服治肺胃虛寒咳嗽喘急并久勞嗽唾血腥臭

洗肺散半夏黃芩天麥門冬與杏仁甘草五味姜煎服咳

嗽痰盛用最靈半夏三分黃芩二分半天門冬麥門冬五味子甘草各五十分杏仁一分姜煎溫

服治咳嗽痰盛肺氣不利

貝母散中桑白皮欬冬花與杏仁知五味甘草姜煎熟火

嗽日久服無時貝母桑白皮五味子甘草各五十分知母二分半欬冬花二錢杏仁二錢姜煎溫

香服治咳嗽多日不愈火嗽亦宜久
甚者加黃蠟五分同煎以潤肺

欬冬花散知母先桑葉麻黃阿膠粘杏仁貝母并半夏甘

草咬咀入姜煎

欬冬花杏仁阿膠麻黃半夏各五分桑葉知母貝母甘草各一錢姜煎溫服治

肺感風寒咳嗽

霍亂吐瀉痛鼻塞流涕

木瓜湯用吳茱萸曲杏甘草蘇鹽扶再研生蒜塗心脚不

慮昏危入腹愈

木瓜吳茱萸各二錢茴香三分半甘草二分生薑紫蘇各少許水煎入鹽一撮溫

服治霍亂吐瀉

心痛瀉轉筋擾悶

手拈散用玄胡索沒藥甘草五靈脂

等分每服三錢溫酒

下心脾氣痛總能醫

一方只用玄胡索五靈脂等分先將靈脂焙乾後同玄胡索將水紋

熟云查入酒
醋少許刺服

鷄舌香散有良姜赤芍肉桂香附良天白烏藥同甘草入

鹽些小點煎湯良姜赤芍肉桂香附烏藥各四錢甘草五錢為末每二錢鹽湯點服治男婦臟

腑虛弱陰陽不和中脫氣滯停積痰飲胃膈脹滿心脾引痛

蟠葱散用玄胡索桂姜蒼木甘砂搏稜莪青檳白茯苓

煎熱服見懽樂玄胡索肉桂乾姜各一分蒼木甘草各四分砂仁檳榔丁皮各二分三稜莪木

青皮白茯苓各二分連鬚葱一根水煎熱服治男婦脾胃虛冷氣滯不行攻刺心腹痛連胃膈上膀胱小腹腎氣

及婦人血氣刺痛並皆治之

香茹散內藥三般厚朴相參扁豆攢加上黃連為絕妙和

中祛暑最能安

香茹一錢半厚朴扁豆黃連各七分四

必沈冷服乃効治暑引飲或吐或瀉姜能祛暑和中惟氣實者宜用

如藿湯

即香茹散合藿

香正

香葛湯

即香茹散合葛根湯

十味香茹散

即香茹散合四君子

湯加黃芪木瓜等分爲末熱湯冷水任調下消暑氣和脾胃

桂苓甘露

飲即五苓加上寒水滑石蒸甘草爲末姜湯下

濕熱霍亂見功高

茯苓澤瀉各一兩白朮猪苓肉桂各五錢甘草石羔寒水石各二兩滑石

四兩爲末

每三錢溫湯新汲水任下姜湯尤良治傷寒

中暑見風飲食中下一切所傷濕熱內甚口乾煩渴飲

冷霍亂轉筋腹滿痛悶及小兒吐瀉驚

風二方去猪苓加三參藿香葛根木香

六和湯

半夏縮砂仁杏仁參草扁豆停木瓜赤茯苓香葉

香茹厚朴治瀉頻

半夏砂仁杏仁人參甘草各一分扁豆木瓜赤茯苓藿香各四分香茹厚

朴各八分姜棗煎溫服治暑傷心脾霍亂轉筋嘔瀉寒熱痰嗽痞喘頭目昏痛肢體浮腫便澀見暑背寒伏熱厥冷瘧痢中酒煩渴畏食又暑毒客上焦胃膈痞塞上氣喘急湯藥入口即吐加麝少許神効如日間見暑夜感風露加川芎羌活婦人胎前產後亦宜

清暑益氣草參芪麥冬五味青陳皮澤瀉升麻蒼白朮神

麴葛柏與當歸

見三卷一百卅一

清脾飲裏有柴胡半夏黃芩草菓咀白朮茯苓加厚朴青

皮甘草棗姜扶

柴胡半夏黃芩草菓白朮茯苓厚朴青皮各等分甘草減半姜棗煎服治因食

傷脾停滯痰飲發瘧熱多寒少或但熱不寒膈滿能食口苦舌乾心煩而渴此方乃小柴平胃二陳合而加減

一方倍茯苓至五錢加常山二錢姜
煎露服五更截瘧令人不吐為妙

人參養胃木苓甘陳半朴菓藿梅堪能醫外感停痰食寒

瘧亢當早服含寒多加桂附有熱加柴胡

言歸醫中散茯苓芍藥半夏橘紅青熱加柴胡寒菓烏

梅姜菓畏勞形驚甲一錢川芍當歸茯苓芍藥半夏陳

勞瘧寒熱如熱多加柴胡寒多加草菓皮青皮各五分烏梅一箇姜菓煎服治

對金飲子先厚朴蒼朮甘草陳皮撮加上草菓又為良姜

菓煎來調治瘧厚朴蒼朮甘草陳皮草菓各等分姜菓煎服治寒熱瘧疾愈後調理脾胃尤好

導滯湯歸苓連桂太黃檳木甘草次赤加甘草白加姜胃

弱去黃加木制見六卷

地黄湯芍木栢榆枳滑加之

因痛墜生地方藥白木黃栢各一錢地榆五分水煎溫服治血痢疼痛如腹痛加枳壳厚朴後重加滑

石初起用導滯湯稍久用地黃湯

真人養臟湯 粟壳參訶子當歸肉寇真白木木香并芍藥

乾姜肉桂不須尋罌粟壳一錢八分人參當歸白木各二分訶子六分肉豆蔻二分半木香

七分芍藥八分乾姜肉桂各四分一方有甘草九分水煎服治大人小兒冷熱不調下痢赤白或膿血如魚腦

裏急後重臍腹痛及脫肛下墜酒毒便紅等症皆宜惟臟寒者加附子

參濕湯中白木先丁香蒼朮茯苓甘草陳皮有等分乾

姜加上濕皆痊白朮二錢蒼朮二錢茯苓甘草乾姜各五分丁香陳皮各二分半姜棗煎服

寒濕所傷身體重着如坐水中小便澀大便澀

除濕湯中用霍香陳皮厚朴木各蒼白朮茯苓并半夏入

些甘草在中央霍香蒼朮厚朴半夏各八分陳皮白朮茯苓各四分甘草二分姜棗煎服治寒

濕所傷身體重着腰脚痠疼大便澀泄小便澀或利

五苓散內用猪苓白朮茯苓澤瀉停肉桂用之多與少白

水煎來止渴行見三卷百十葉四苓散即本方去肉桂

茹苓湯即香茹散合五苓散藿苓湯即藿香正氣散合五苓散

木香化滯湯當歸稍枳實陳皮半夏遙柴朮紅花草豆蔻

甘草生薑腹內消半夏一錢柴胡蒼朮各四分草豆蔻五分木香陳皮各三分歸尾一分枳

實二分紅花甘草各半分姜煎溫服治因憂氣食濕鬱結於中脘腹皮底微痛心下痞滿不思飲食常帶痞氣

泄瀉衛生湯即六君子加上山藥薏苡仁澤瀉黃連各等分虛

痰火瀉効如神見六卷三四葉

茵陳蒿湯只一味濃煎退疸去身黃施子栢皮兼可用五

苓加上又為良見三卷七五葉

一清飲子赤茯苓川芎甘草柴桑皮生薑棗子煎來服黃

疸發熱用之靈茯苓二錢柴胡三錢川芎桑白皮各一錢甘草五分姜棗煎服治黃疸發熱及

諸熱ラ

水腫通用ス

五皮散方亦甚奇大腹桑根固用皮茯苓姜橘俱等分能

救渾身沒指危

太腹皮桑白皮茯苓皮生薑皮橘皮各等分水煎溫服忌生冷油膩堅硬之物

治風濕凝滯脾經面目虛浮四肢腫滿心腹膨脹上氣喘急一方去桑橘皮換地骨皮五加皮治姙娠子氣

赤小豆湯木猪苓桑皮防已連翹仁漆瀉當歸商陸芍熱

甚加犀角又神

猪苓桑白皮防已連翹澤漆澤瀉當歸商陸赤芍赤小豆等分姜煎治血氣俱

熱遂生瘡疥變為腫滿或生煩渴

三和湯中君紫蘇橘朴檳榔甘草扶白米金砂木通等姜

煎行腫可通渠

紫蘇橘皮厚朴檳榔甘草白米海金砂木通各等分姜煎溫服治水腫如脾弱

者倍白米入姜汁氣虛加人參血虛加牛膝當歸身

脹滿

平肝飲子用防歸枳梗川芎木桂枝揀參橘芍檳甘草腹

脇妨暈嘔脹醫

防風枳壳桔梗桂枝赤芍各五分當歸川芎木香人參橘皮甘草檳榔各二分

半姜煎治喜怒不節肝氣不平邪乘脾胃心胃腹脇脹滿頭暈嘔逆脉來浮弦

分氣紫蘇飲陳皮太腹桑根白共推甘桔菓苓五味子喘

氣脾虛病可移

紫蘇一錢六分大腹皮桑白皮甘草桔梗菓苓各二分姜煎入鹽

少許溫服治男婦脾胃不和胃膈噎塞腹脇疼痛氣促喘急心下脹悶飲食不思嘔逆不止

太正氣散藿香葉檳榔木半乾葛疊枳壳橘紅朴桂甘風

寒濕氣脹瀉

白朮一錢半藿香檳榔半夏乾葛枳壳橘皮厚朴桂枝甘草各五分姜棗煎服

治脾胃怯弱為風寒暑濕氣所傷心腹脹滿有妨飲食

人參歸湯木香蓬朮台烏甘草將砂桂五靈脂半夏入

些蘇葉棗生姜

當歸五分木香蓬朮烏藥砂仁七分人參并草官桂五靈脂各四分川芎半黃

各一錢紫蘇姜棗煎服治咽燥漱水迷妄驚恐痛悶喘急虛汗厥逆小使多太便黑肚腹膨脹名曰血脹症

革薛分清飲葛蒲茯苓甘草天台烏益智仁等鹽煎服通

心氣止精濁餘

革薛石葛蒲茯苓并草烏藥益智各等分入鹽一捻煎服如精滑別以綿裹龍

骨同煎治真元不足下焦虛寒小便白濁頻數無度腰痛

人參順氣散

芎甘梗朮芷陳皮枳殼等麻黃烏藥與白姜

一切風寒腰痛省

見六卷四二葉

獨活湯中有大黃桂澤羌翹桃仁防黃連歸栢已甘草芳

後腰痛免成傷

見六卷四二葉

蒼朮復煎散紅花黃柏柴胡川升麻藁本澤瀉羌白木腦

項背膝腰痛佳

蒼朮四兩紅花少許黃柏三錢柴胡升麻藁本澤瀉羌活白木各五分先用冰

二碗煮蒼朮至二鍾去渣入餘藥煎服治寒濕相合腰

痛惡寒煩悶脉沉洪項背脊骨髀眼膝腰疼痛忌油麩

補腎湯即四君子加芪附沈羌木瓜甘草紫蘇川芎少寒

疝泄瀉用之佳

川芎甘草各二分姜煎溫服治下

寒入小腹疼痛泄瀉胃滿痞塞

白葱散即四物湯枳朮茯苓桂姜參練麴蘗青蒿木葱

鹽煎治冷膀胱

川芎當歸生地芍藥枳朮厚朴莢朮三稜茯苓官桂乾姜人參川練肉神麴麥芽青皮茴香木香各等分葱白食鹽煎服如大便秘去鹽入大黃治一切冷氣入膀胱痛大

治胎前產後腹痛胎動不安或血刺痛兼血臍宿冷百節倦痛肌體怯弱勞傷帶瘕

聚香飲子乳沈丁木檀藿香葉共成胡索姜黃烏梗桂甘

草姜煎疝氣寧

乳香沈香丁香木香檀香藿香各五分玄胡索姜黃川烏桔梗桂心甘草各二

分半姜棗煎服治七情所傷遂成七疝心脇引痛不可俛仰

烏附通氣

湯

四苓散加歸芍橘香查草不問疝氣久與新

風寒暑濕氣皆歸

白朮七分茯苓澤瀉各五分猪苓甘草各三分烏藥香附當歸芍藥

山查橘皮各一錢水煎溫服治新久疝氣風寒暑濕七情皆効痛甚加檳榔玄胡索脉沈細惡寒加吳黃

脚氣

檳蘇散內香蘇多甘陳檳瓜一半和姜葱煎服治脚氣風

濕疎通効若何

蘇梗香附各二錢甘草陳皮檳榔木瓜各一錢姜葱煎服治風濕脚氣疎通氣道

左經湯麻桂苓壳柴半甘加羌防朴姜苓小草已門冬

症加減旋斟酌麻黃桂心黃苓枳壳柴胡半夏甘草羌活防風厚朴白姜茯苓小草防已麥門

冬各等分姜棗煎服治三陽經脚氣痿濕風腫腰足拘

挛喘滿煩悶大小便秘如自汗去麻黃加白朮獨活有

大腹皮散宣木瓜蘇葉子同蘿蔔佳沈香烏藥檳榔橘枳

壳桑皮荆芥花大腹皮六分木瓜五分蘇葉蘇子烏藥檳榔橘皮各二分蘿蔔子沈香枳壳桑

白皮荆芥穗各二分姜煎溫服治諸脚氣腫痛小便不利

烏藥平氣散烏藥茯神甘草參朮芎歸木芷含五味蘇子皆等分

姜煎脚氣悉皆堪烏藥烏藥茯神甘草人參白朮川芎當歸

煎服治脚氣上攻頭目昏眩脚膝痠疼諸氣不和喘滿迫促

當歸拈痛湯

羌活陳草芥升葛苦參人蒼白朮防猪澤瀉

茯苓知母去查塵

當歸防風猪苓澤瀉茯苓知母各三分羌活茵陳甘草黃芩各五分升麻

乾葛苦參人參蒼朮各二分白朮一分半

水煎溫服治

濕熱為病肢節煩疼肩背沉重胸膈不利遍身疼痛足

脛腫痛

等症

獨活寄生湯

桑寄生杜仲牛膝細辛參秦艽茯苓桂枝

地黃防風當歸芍

獨活三錢桑寄生杜仲牛膝細辛人參秦艽茯苓桂枝防風川芎各二分

芍藥生地當歸各三分甘草半份姜煎溫服或為丸加

乳香沒藥治腎氣虛弱腰背拘急筋攣骨痛脚膝偏枯

冷痺緩弱一方有附子如歷節風

并脚氣加乳香沒藥酒糊為丸服

燥渴

活血潤燥生津飲天麥門冬五味子瓜蒌麻仁草當歸地

黃生熟天花使

天門冬麥門冬五味子瓜蒌仁麻子仁甘草當歸生地黃熟地黃天花粉各等

分水煎溫服

錢氏白米散參苓甘草葛根五味寧藿香木香柴枳殼中

消善穀十分靈

白术人參茯苓甘草藿香各四分葛根各八分枳壳五味子木香柴胡各二分

水煎溫服治消中善饑消穀

如小兒去柴胡枳壳五味子

滋陰降火

湯

古方稀四物湯中加栢知甘草陳皮并白木

天麥門冬遠志依

當歸生地白芍白术各一錢麥門冬甘草各五分知母黃柏遠志陳皮川

芎各六分姜煎溫服治潮咳汗血遺精夢泄者乃養血降火之聖藥也如有痰加瓜蒌仁貝母咳嗽加五味子

阿膠夢遺加次實石蓮肉有熱加秦光地骨皮吐咯
血加茜根藕汁玄參氣虛血少加參芪久病者去川芎

人中白散生甘草青黛黃柏如金寶為末童使調二錢花

溪治火方真巧

人中白二兩黃柏甘草青黛各五錢急
末每二錢童使調服治陰虛火盛及

心煩熱

等症

脇痛

枳壳煮散防風芎乾葛細辛甘梗充姜煎一盞空心候脇

疼氣痛儘能攻

見六卷
五一葉

鹽煎散歸芎芳稜我枳袂麥神麴青朴木小茴各等分葱

根兼治腹心疼

見六卷
五一葉

復元通聖散穿山甲青陳甘草瓜薑屑每用熱酒下一錢

諸痛諸瘡活氣血

穿山甲、瓜蒌根各四錢、青皮、陳皮各二錢、甘草三錢、為末、酒調服、治諸氣

閉、溢耳聾耳疼、諸瘡、腹癰、便癰、瘡疽、一切氣刺如瘡、無頭者、津液調敷、諸瘡、腫痛、加金銀花、連翹各一錢

淋

五淋散治五般淋歸芍梔甘赤茯苓每用空心煎水服何

憂氣血石膏淫

當歸、甘草各五分、芍藥、山梔各一錢、赤茯苓六分、水煎、溫服、治腎氣不足、膀胱

有熱水道不通、淋瀝、不出、或熱淋、便血

清心蓮子飲黃芩甘草車前赤茯苓麥門地骨參芪使下

虛上盛作諸淋

蓮子、赤茯苓、人參、黃芪各七分半、黃芩、甘草、車前子、麥門冬、地骨皮各五分、如

發熱加柴胡、薄荷、水煎、溫服、治下虛上盛、心火上炎、口苦咽乾、煩渴、小便赤澀、欲作諸淋

脾胃

平胃散中四般藥蒼朮陳皮厚朴攢更加甘草調脾胃生

姜棗子一同煎

平胃散蒼朮二錢調脾除濕寬中陳皮一錢四分和胃消痰溫中厚朴一錢去

滿除濕調中甘草八分調脾瀉火和中姜棗煎入鹽少

許溫服此藥和脾健胃扶根固本兼有他症照依藥性

加減溫補炒

平胡飲子

即本方合小柴胡湯治瘧寒熱相等

熟消導生用

參苓白朮

散

薏苡仁甘草蓮肉山藥停桔梗扁豆砂仁用

棗煎虛熱用之靈

人參茯苓白朮甘草山藥各三錢薏苡仁蓮肉桔梗白扁豆砂仁各一錢

半為末每二錢棗子煎湯調服治脾胃虛弱

飲食不進或吐瀉及大病後調助脾胃最妙

凝神散參苓白朮山藥扁豆粳米續地黃地骨甘知母門

冬竹葉用幾十

人參茯苓白朮山藥各一錢扁豆粳米生地甘草知母各五分地骨皮麥門冬

淡竹葉各二分半姜棗煎服大能收斂胃氣清涼肌表

一方去山藥扁豆知母竹葉地皮加黃芪當歸白芍茯苓

神枯梗治癆瘵症
聲重血系瘦之

葛花解醒湯

縮砂仁木香豆蔻茯苓陳參姜朮澤猪神麴

酒調一服味清辛

葛花砂仁白豆蔻各五錢木香五分
茯苓陳皮人參猪苓各一錢半青皮

乾姜白朮澤瀉各二錢神麴二錢為末每二錢白湯或
酒調服得微汗為度治飲酒太過嘔吐痰逆心神煩亂
胃膈痞塞手足戰慄
飲食減少小便不利

益胃散姜黃澤瀉乾姜砂草益智仁白蔻黃芪參厚朴陳

皮通用十分靈

姜黃乾姜白豆蔻各三分澤瀉砂仁甘
草人參黃芪厚朴陳皮各七分益智仁

六分水煎溫服治服寒藥過

多或脾胃虛弱胃脘作痛

積聚

青皮湯橘玄胡索朮三稜神麴藥姜煎痞滿雖能調過

服能令人氣弱

青皮一錢 莪朮二錢 各七分 陳皮神麴 各五分 玄胡索二分 姜煎溫服進食健

脾消積化聚如痞滿加炒黃連三分有鬱加山梔仁

食加山查麥芽各二分婦人加香附一錢半川芎八分

紅花木香

各一分

消積正元散木苓麥查甘橘海粉青香砂麴枳玄胡索鬱

火仍須善減增

白朮一錢 茯苓陳皮青皮砂仁麥芽山查甘草各二分 神麴香附枳實玄胡索

海粉各五分姜煎溫服如上下焦火鬱加酒炒芥連下

焦火鬱加炒桅槓冷氣作疼加沈香木香麻仁水刺服

散聚湯杏附桂心檳榔橘半吳萸侵茯苓芎歸甘草朴便

秘太黃旋酌斟

杏仁桂心橘皮各二分 附子吳萸茯苓枳殼川芎厚朴甘草各一分 檳榔半夏

當歸各少許姜煎溫服如大便秘加大黃治久氣積聚

狀如癥瘕隨氣上下發作有時心腹絞痛攻刺腰脇小

腹膜脹大

小便不利

氣

四七湯理七情氣陳皮厚朴半夏製紫蘇葉同生姜煮

急兼將中脘和

四七湯厚朴一錢半半夏二錢半茯苓

痰涎凝結如絮膜如梅核室禍咽喉之間咯不出燕不

下或中脘痞滿氣不舒快或痰涎壅盛上氣喘急或因

痰飲中節嘔逆惡心兼治婦人惡

阻及男子思慮過度小便白濁

七氣湯中半夏多朴桂苓芍紫蘇生橘參姜棗同煎服七

情霍亂妙難過

半夏一錢厚朴桂心各六分白茯苓白

芍各八分紫蘇橘皮各四分人參二分

姜棗煎溫服治下七情鬱發致五臟陰陽乖戾吐利交作

寒熱眩暈痞滿噎塞一方用人參甘草肉桂各五分半

夏二錢半姜煎服治下七情鬱結

干中心腹絞痛大便虛秘等症

太七氣湯。稜莪真。橘。藿梗。桂。益智仁。甘青。香附。煎。白水。

切。氣。積。自。舒。伸。

三稜莪朮青皮陳皮藿香桔梗官桂益智仁各一錢甘草七分半香附一錢半

姜。棗。煎。服。治。七。情。相。午。陰。陽。不。得。升。降。氣。

道。壅。滯。攻。衝。作。疼。一。方。無。三。稜。有。半。夏。燭。

大異香散。京三稜。莪朮。半夏。與陳青。藿梗。益智仁。香附。子甘。

草。枳。壳。有。高。能。

三稜莪朮青皮陳皮半夏燭藿香桔梗益智仁香附枳壳各五分甘草半份姜

棗煎服治

穀脹氣脹

紺珠正氣天香湯。天台烏藥。與乾姜。香附。陳皮。紫蘇。葉。婦

人得此是奇方。

烏藥一錢半香附六錢陳皮紫蘇乾姜各六分水煎熱服治婦人一切諸氣作

痛。或。上。奏。心。胃。或。攻。築。脇。肋。腹。中。結。塊。發。渴。刺。痛。月。水。因。之。不。調。或。眩。暈。嘔。吐。往。來。寒。熱。胎。前。產。後。一。切。氣。症。

分心氣飲木通桂赤芍茯苓半夏配桑白大腹青陳皮甘

草羌活紫蘇對

木通官桂赤芍茯苓半夏甘草羌活桑白皮大腹皮青皮陳皮各五分紫蘇

二分姜棗煨心煎服治男婦一切七情留滯心胃痞悶脇肋虛脹壅塞吞酸嘔噦惡心頭目昏四肢倦面色黃口舌乾飲食減少日漸羸瘦或大腸虛瀉或病後胃中虛痞不思飲食皆效

流氣飲子蘇烏藥青陳大腹苓歸芍芎芪枳半防風甘木

香桔梗隨人酌

紫蘇烏藥青皮桔梗各五分陳皮茯苓當歸芍藥川芎黃芪枳實半夏防風甘

草各七分半大腹子一錢木香二分半一方有枳壳檳榔各五分姜棗煎服治氣攻有背脇肋走注疼痛及瘰脹嘔喘氣閉浮腫脚氣

木香流氣

飲

藿蘇茯苓木甘草檳瓜通夏朴青丁陳大腹

蓬蒲桂芷香麥冬

木香藿香甘草檳榔丁香大腹皮蓬
木肉桂各六分紫蘇甘草厚朴青皮

陳皮香附各一錢半赤茯苓人參白朮木瓜菖蒲白芷
麥門冬各四分木通八分半夏二分姜棗煎服治諸氣
痞塞胃膈膨脹面目虛浮四
肢腫滿口苦咽乾大小便秘

木香勻氣

散

藿丁檀白豆砂仁甘草鹽點服沸湯為末用

氣痞惡心積痛聞

木香丁香檀香白豆蔻各二錢藿香
葉甘草各八錢砂仁四錢一方有沈

香為末每二錢入鹽少許沸湯點服治氣滯胃膈
虛痞惡心宿冷不消心腹刺痛又名木香調氣散

木香順氣散青陳智澤歸吳姜半苓升柴草蔻蒼朴類能

消腹脹濁氣生

木香草豆蔻蒼朮各三分厚朴四分青
皮陳皮益智仁茯苓澤瀉生姜半夏吳

更當歸各五分升麻柴胡各一分
水煎溫服治濁氣在胃則生腹脹

蘇子降氣湯半夏甘草煎胡肉桂咀常歸厚朴陳皮等姜

棗同煎痰喘舒

蘇子半夏麴各五分甘草煎胡當歸厚朴各二分肉桂陳皮各三分姜棗煎服

治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅盛如喘

加人參五味杏仁鹽梅紅棗虛煩加知母人參煎服

秘傳降氣湯訶子甘草柴胡骨碎補桑陳地骨五加皮枳

梗半夏麴蘇使

訶子甘草骨碎補五加皮桔梗半夏麴各二分甘草柴胡地骨皮枳壳陳皮各

四分桑白皮八分紫蘇一分姜煎溫服治氣不升降上

盛頭目昏眩痰實嘔逆胃緊舌瘡咽痛耳聾下虛腰脚

無力小便數大便秘如心肺虛滿加人參茯苓

熱盛加黃芩甚加附子婦人血虛加當歸

三和散用沈木香芎朮紫蘇大腹羌檳榔木瓜甘草葶水

煎和氣自通腸

沈木香紫蘇大腹皮羌活各四分木香白朮檳榔橘皮甘草各三分川芎一錢二

分木瓜二分水煎溫服治七情氣結五臟脾胃不和心腹脹急大小便秘寢食俱廢不渴者乃氣秘耳未可施以硝黃秘甚再加枳殼蘿蔔子皂角子氣滯腰疼倍木瓜浮腫加車前子葶藶子小便閉加麥門冬澤瀉

復元通氣散

陳白丑甘草穿甲木香有索歸乳沒俱為末

鬱痰癰疽并跌墜

陳皮白丑甘草玄胡索各一錢半乳香沒穿山中木香當歸各一錢半乳香沒

藥各五分為末每二錢熱酒白湯任下治一切氣不宣通瘀血凝滯周身走痛并跌墜損傷或負重到悶氣滯血分作痛等症一方去白丑玄胡當歸加青皮白芷貝母漏蘆治發乳癰疽及一切腫毒瘡癤

犀角地黄湯牡丹芍藥四件有機關加上太黃黃芩藥能

消痰熱發狂蠻

見二十二卷七七葉

清胃散升麻二錢六分歸地與黃連牡丹皮用一錢重能

止吐血及牙宣

升麻一錢牡丹皮一錢當歸生地黃連

各六分水煎冷服治胃經膏梁積熱

枇杷葉散香茹君麥門陳皮厚朴芬丁瓜甘與茅根和暑

毒攻心吐血欣

枇杷葉陳皮厚朴丁香各五分香茹七分半麥門冬木瓜茅根各一錢炙甘草

二分姜煎溫服或為末水調服治中暑伏熱煩渴引飲嘔噦惡心頭目昏眩

小薊飲子生地黃蒲滑通草藕節房甘歸竹葉山梔子每

服空心白永涼

小薊生地蒲黃滑石通草藕節甘草當歸淡竹葉山梔各五分水煎溫服治下

焦結熱尿血成淋

大薊飲子桑白皮犀角升麻甘草宜蒲黃杏仁桔梗炒肺

痘熱血用之宜

各等分甘草減半姜煎溫服治下
炎辛熱傷肺嘔血各白肺癰

歸脾湯歸龍眼肉酸棗遠志參芪朮茯神木香甘草姜憂

思過度真宜服

當歸龍眼肉酸棗仁遠志人參黃芪白
朮茯神各一錢木香五分甘草二分姜

棗煎服治憂患傷脾內熱食少體倦或血妄行發熱嘔
吐或健忘怔忡驚悸少寐或心脾作痛自汗盜汗或肢
體腫痛大便不調或經候不調補
熱內熱或唇口生瘡流注等症

二陳芎歸湯人參阿膠五味細辛芍姜煎專治虛勞人毛

寒失血咳嗽咯

半夏陳皮赤茯苓甘草人參阿膠五味
子細辛各五分白芍川芎當歸各一錢

姜煎溫服治虛勞少血津液內耗心火炎肺
咳嗽咯血及血不榮肌肉動輒毛寒咳嗽

胃風湯參與芎歸朮芍桂等相將粟米百粒止便血腹

痛還宜刺木香

人參當歸川芎茯苓白朮芍藥肉桂各七分粟米百粒水煎溫服治風冷乘虛

客于腸胃水穀不化泄瀉注下腹脇盈滿腸鳴疝痛及腸胃濕毒下如豆汁或下瘀血

當歸和血散槐花青皮荊芥穗升麻川芎白朮并熟地腸

一癖濕毒用之佳

當歸升麻各二錢槐花青皮荊芥白朮熟地各六分川芎四分為末每二錢米

飲下治腸癖濕毒下血

涼血地黄

湯歸槐青栢知等分血痢靈去槐青加荊細蔓

羌防芎藭麥冬連升柴胡紅花依次入空腹煎嘗治血崩

熟地當歸槐花青皮黃栢知母各等分如小便澀大便秘後重加木香檳榔水煎溫服治血痢最妙一方去槐花

青皮用生地當歸各五分知母黃栢各二分加荊芥細辛蔓荊子黃芩各一分羌活防風柴胡各二錢川芎藭

痰

本黃連升麻各一分紅花少許水煎溫服治血崩因腎水真陰不能鎮守胞絡相火故血走而崩經脉不任或如豆汁五色相雜面黃體痛寒熱

五飲湯即六君子加枳朴猪澤前胡桂心芍藥旋覆等

煎痰飲盡消除

人參白朮茯苓甘草枳實厚朴陳皮半夏猪苓澤瀉前胡桂心芍藥旋覆花各

等分姜煎溫服忌食肉生冷等物治酒後傷寒飲冷過多故成五飲如因酒有飲加葛花砂仁

小調中湯製法奇連草瓜半交相持大調中湯用四味少

加參朮茯苓歸

黃連煎水浸甘草甘草煎水浸黃連瓜蒌仁煎水浸半夏夏半煎水浸瓜蒌仁

各炒水乾為度四味各等分姜煎溫服良姜汁糊為丸服尤妙治一切痰火及百般怪病善調脾胃神効

大調中湯

即本方加人參白朮茯苓川芎當歸生地白芍治虛而挾痰火者用百般加減由人

喘

定喘湯

麻桑杏蘇子白菓欬冬花最良甘草黃芩同半夏

水煎百沸不須姜

見三六卷
七十二藥

嘔吐

安脾散菓木丁香百年壁土煮良姜椒參朮橘苓甘草入

鹽點服米煎湯

高良姜一錢用陳壁土和永煮至乾菓木香丁香胡椒人參白朮橘皮茯苓

各五分甘草一錢半為末每二錢米飲入鹽少許調服治傷飲傷胃喫食噤酸嘔吐葷水不巳

丁香煮散益智椒紅豆青陳甘草稍乾姜良姜川烏炮姜

鹽煎治胃家翻

丁香紅豆蔻青皮陳皮甘草乾姜良姜川烏各四分益智仁五分胡椒二分姜

鹽煎服治脾胃

虛冷嘔吐不食

飢逆

丁香二陳湯藿香柿蒂二陳湯茹參二方倍用生薑汁飢

逆吞之不作聲

丁香二陳湯陳皮二錢茯苓半夏各一錢半甘草藿香各五分丁香四分姜煎

入姜汁三五匙調服○柿蒂二陳湯即前方去藿丁加柿蒂人參各一錢竹茹一團

丁香透膈湯

沈木香甘草藿麥冬麴蘗芳藿木砂附青陳朴

肉蔻白蔻半夏當

各二二分半沈香藿香陳皮厚朴各二

分甘草七分半草菓神麴半夏各一分半人參茯苓砂仁香附各五分白朮一錢姜棗煎服治脾胃不和痰逆惡心嘔吐飲食不進

十膈五噎痞塞不通

膈噎

五膈寬中散

青陳皮丁香厚朴甘草咀香附砂仁白豆蔻

木香八味總堪書

青皮陳皮丁香砂仁各四分厚朴香附各一錢半甘草五分木香三分白

豆蔻二分或加南星半夏為末每二錢姜鹽湯點服治四氣七情傷脾陰陽不和胃膈痞滿停痰氣逆遂成

膈一切冷氣

並皆治之

五噎湯即六君子

湯去半夏

朴枳稜義麴孽使訶桂木檳姜棗

煎虛實由人加減爾

見六卷七五葉

大續命湯桂麻黃竹瀝生地汁兩防附子石羔龍齒末姜

煎治癰身反張

肉桂附子石羔防已各二分麻黃防風龍齒生薑各四分水煎入竹瀝七匙生

地汁五匙頻服治癰角

恒仲 弓反張窺視口噤吐沫

妙香散要麝香真山藥茯苓并茯神參芪遠志炙甘草木

香桔梗硃砂珍

麝香一錢山藥茯苓茯神黃芪遠志各一兩人参甘草桔梗各五錢木香二錢

半辰砂三錢為末每一錢溫酒調服治男婦心氣不足精神恍惚虛煩少睡多盜汗常服補益氣血安鎮心神

喉痺

按華桔梗湯蓮翹薄荷黃芩梔子饒甘草同煎加竹葉喉

痺腫痛十分標

各等分水煎溫服即來
隔意也治熱腫喉痺

十全大補有人參肉桂川芎地黃熟芍藥茯苓并白朮黃

芪甘草當歸停

十全大補湯人參白朮茯苓甘草當歸
川芎熟地芍藥肉桂黃芪各二分半姜

棗煎服治男婦諸虛
勞傷生氣血壯脾胃

人參養榮即大補去芎加橘遠味熬劫勞散亦大補湯去

芎桂加半味膠

人參養榮湯白芍二兩當歸人參白朮
甘草黃芪肉桂陳皮各一兩熟地五味

子茯苓各七錢遠志五錢每二錢姜煎空心溫服虛甚
者煉蜜為丸可以常服治積虛成損四肢倦怠肌肉消

瘦面少顏色汲汲短氣飲食無味如遺精加
龍骨咳嗽加阿膠麥門冬按火加知母黃柏

劫勞散

白芍一錢黃芪甘草人參茯苓熟地當歸五味子半夏
麩阿膠各四分姜棗煎服治心腎俱虛勞嗽無痰夜熱
盜汗四肢倦怠體瘦食少恍惚
忽異夢嗽中有血各曰肺痿

黃芪建中湯肉桂甘草為藥補榮衛姜棗飴糖煎服之或

加當歸同此類

黃芪肉桂各七分甘草一錢半白芍三錢姜棗煎去渣入飴糖少許再煎令溶

空心服治男婦諸虛不足小腹急痛脇脹胃痛驚悸面黃唇乾口燥腰痛骨痠行步喘乏短氣少食或因勞過或病後不復最宜服之如
重甚加附子血虛加當歸

黃芪益損湯斛桂芍歸木半甘术地白芍五味熟地柴諸

虛勞倦此方議

官桂熟地半夏甘草木香各三分石斛當歸川芎黃芪白术各一錢白芍一錢

半五味子五分姜棗

煎服如有熱加柴胡

從容散木已門冬茯苓牛味杜仲供車前乾姜生地輩酒

調陰痿最多功肉從容白朮巴戟麥門冬茯苓甘草牛

五錢生地半片為末每二錢食前酒調日三服治腎氣虛寒陰痿腰脊痛身重脛弱言音混濁陽氣頓絕効

固真飲子參木歸山藥芪地栢澤茱萸搏補骨脂五味陳皮

茯苓杜仲甘草酌人參山藥當歸黃芪黃柏各一錢熟地一錢半白朮澤瀉山茱萸補骨脂

各五分五味子十粒陳皮茯苓各八分杜仲甘草各七分分水煎溫服蓋門冬地黃雖本於滋陰又則瀉胃滯經致生虛損又或多服金石桂附助陽又則積溫成熱其損真陰痰火妄動消渴肺痿症作惟此方備五味中年已上之人可以常服能治陰陽兩虛氣血不足飲食少五心熱自汗日晡潮熱精氣滑脫行步無力腰膝痠疼泄瀉脉沉弱嗽少痰多或乾咳或氣血精神不足體倦頭自昏食少脉虛數潮熱將成癆症者或傷力氣虛脉

弱腰背痛、動輒鼻衄者、或便血過多、面黃瘦瘁、食少氣促者、或婦人陰虛、瘦瘁、食少、虛熱自汗、腹痛、面黃、腰痛、赤白帶下者、並宜服之。此方備五味、含氣沖和、養氣血、理脾胃、充腠理、補五臟、無寒熱偏併、過不及之失也。

正氣補虛湯 參 藿 朴 芪 地 芎 茯 苓 等 分 各 桂 歸 芷 味 木 丁 姜

附木夏草減半勺

人參 藿香 葉厚朴 黃芪 白芷 當歸 熟地 川芎 茯神 各五分 肉桂 五味子 白

木半 夏附子 丁香 木香 乾姜 甘草 各二分半 姜棗 空心煎服

治內傷飲食七情兼外邪所襲寒熱頭痛身疼腰

脚軟弱轉筋自汗肢冷麻痺男婦

諸虛通用婦人產後感寒尤宜

勞瘵

秦艽扶羸湯 鱉甲 柴胡 人參 當歸 切 地骨皮 半 紫苑 甘能

治肺膽二經熱

秦艽 鱉甲 人參 當歸 半夏 紫苑 甘草 各五分 柴胡 一錢 地骨皮 七分半 烏梅 姜

棗煎服治肺二經虛熱及肺痿骨蒸已成勞嗽或寒

或熱聲啞不出體虛自汗四肢怠惰加干熱癆症加大黃

黃芩犀角赤芍青蒿
桃枝煎服勞瘧亦効

黃芪幣中湯 桑地皮桂苑參苓柴半知天冬地黃赤芍藥

秦艽甘桔也相宜 桑白皮半夏甘草各二分半地骨皮
知母黃芩秦艽白茯苓赤芍柴胡各

三分三釐鱉甲天門冬各五分肉桂人參苦梗各一分
六釐半紫苑生地各三分水煎溫服治虛勞客熱肌肉
消瘦四肢煩熱心悸盜汗少食多
咳嗽有血往來寒熱勞瘧等症

保和湯 知貝天麥門欬冬意杏仁薑根塊苑合桔甘五味

歸地蘇薄姜飴炆 見六卷
九二葉

保真湯 歸芍朮芪參蓮肉天麥赤白苓陳方知栢柴甘味

地骨地黃熟又生 見六卷
九二葉

蒸熟

清骨散柴生地黄熟地人參薄荷防秦光赤茯苓連少每

服半兩水煎

柴胡生地各二錢熟地人參防風各一錢薄荷七分秦光赤茯苓胡黃連各五

錢水煎溫服治男婦不拘老幼初覺五心煩熱骨蒸如神如煩赤潮盛加生犀角汁或加猪膽汁一板猪脊髓

一條童便非白煎服惟胃弱者慎之

當歸六黃湯芩連生熟地黃栝綿芪降火補陰止盜汗水

煎一服上床時

黃芩黃連黃栝降火生地熟地當歸補陰各五分黃芪止汗三錢臨臥水煎溫

服止盜汗

之聖藥也

清燥湯芪蒼白朮參苓連栝地黃歸猪澤門冬五味子甘

麴升柴痿痢醫

黃芪白朮各一錢半蒼朮一錢人參茯苓升麻各三分黃連黃栝柴胡各一分

生地當歸猪苓麥門冬甘草神麴各二分澤瀉五分五味子九粒水煎溫服治痿厥癱瘓下痢等症

霍仁養胃湯烏木參草神苓半夏麴砂仁薏苡草澄茄能

治陽明虛痿弱

藿香烏藥白术人參茯苓神茯苓半夏麴砂仁薏苡仁各一錢半煎澄茄甘草各

一錢姜棗煎服治胃虛不食四肢痿弱行立不能皆由陽明胃虛宗筋無所養遂成痿躄

四順清涼

飲

歸方黃甘草等分水煎嘗加以柴苓生薑使

更能解熱入於陽

當歸芍藥太黃甘草各等分水煎溫服治血熱壅結壅滯不通或一身盡

熱或日晡肌熱或夜發熱皆血熱也

涼膈

散

連翹山梔仁大黃甘草朴硝芩竹葉薄荷加蜜煎

諸般積熱効如神

連翹一錢山梔太黃黃芩竹葉薄荷各五分朴硝二分半甘草一錢半水

煎入蜜少許調服東垣去硝黃加桔梗治諸般積熱口
舌生瘡痰實不利煩渴腸胃秘澀便溺不利一切風熱

人參瀉肺湯 即涼膈散去朴硝加枳壳桔梗桑白皮
杏仁各等分水煎溫服治熱嗽便秘

活命丹 即涼膈散加藍根青黛蜜丸彈子大硃砂為衣
金箔裹每臨卧茶清化下下治中風神不清

轉舌膏 即涼膈散加黃蒲遠志為末煉蜜為丸如彈子
大硃砂為衣每服下丸薄荷煎湯化下治中風

癰瘰舌
塞不語

八正散 車前子瞿麥扁蓄滑石山桅仁太黃木通八甘草

熱淋熱疝効如神 各等分燈心煎服治一切
下熱症諸淋諸氣諸血

導赤散 生地木通甘草等分竹葉同去草加苓名火腑熱

淋赤澀總收功 各等分水煎溫服治小腸實熱小便赤
澀而渴煩渴而口舌生瘡○火腑丹見

六卷五
十四葉

半夏湯中姜最多モシ芩地遠志酸棗和茯苓秫米長流水膽

熱不眠用莫訛

半夏生姜各三錢黃芩一錢生地酸棗仁各五錢遠志茯苓各二錢黍米一合

每一兩用長流水煎澄清溫服ス一方無地黃遠志有麥門冬三錢甘草二錢人參一錢治膽腑實熱精神不守

熱泄煩渴悶不得眠

瀉黃散ス藿山梔仁石羔甘草防風停為末酒蜜相拌炒能

醫口內瘡瘻生

藿香七錢山梔一兩石羔五錢甘草三兩防風四兩剉碎用蜜酒拌炒香焙乾

每三錢水煎溫服ス治脾胃壅熱口內生瘡煩悶多渴

瀉白散ス君桑白皮地骨相等甘草微一方加青茯苓人參加

味瀉白散尤奇

瀉白散桑白皮地骨皮各二錢甘草一錢水煎溫服治肺熱上熱氣壅鼻壅或

加知母貝母桔梗山桅仁麥門冬生地之類由人加

味瀉白散桑白皮一錢半地骨皮茯苓各一錢二分人

參八分青皮甘草各二分五味子陳皮各五分粳米一

撮水煎溫服治陰氣在下陽氣在上致咳嗽嘔吐喘促

加味石羔湯桅子參知母生地使竹葉水煎入蜜硝膽

脫實熱服之愈

石羔八錢山桅人參茯苓知母各三錢

查下蜜半合煮二沸食前服欲利加芒硝三錢

治膀胱實熱轉不得小便苦煩滿難於俛仰

婦人

逍遙散三白柴歸等甘草減半薄荷煎婦人調經專用此

加味男癆總是仙

白朮白芍白茯苓柴胡當歸各等分

其草減半薄荷少許煨姜煎服治婦

人月經不調及血虛有熱無汗者最宜或加天花

粉牡丹皮玄胡索黃芩紅花與四物湯加減例同

加味逍遙散

白芍、白朮各一錢、白茯苓、麥門冬、生地各六分、甘草、桔梗各二分、地骨皮、當歸各八

分、山梔、黃柏各三分、水煎溫服、治潮汗咳嗽、虛甚者加山藥、破故紙、枸杞子、餘與癆瘵加減同。

大溫經湯炒阿膠芍藥芎歸參桂抄門冬半牡朮萸草生

姜五片水中地

阿膠芍藥川芎當歸人參肉桂牡丹皮吳茱萸甘草各二分半夏二分半麥門冬

五分姜煎溫服治衝任虛損月事不調或崩中血過多或經損孕瘵血停留小腹急痛五心煩熱

小溫經湯歸芍芎官桂牡丹朮等

客血室痛者省

當歸芍藥川芎官桂牡丹皮朮各五分人參甘草牛膝各一錢水煎溫服治

血海虛寒或為風邪所襲月水不利

滋血湯中用馬鞭牡丹荆芥穗相連桂芍芎歸并枳壳烏

梅一箇也同煎

馬鞭草荆芥各八分牡丹皮二分肉桂赤芍川芎當歸枳壳各四分烏梅一箇

水煎溫服以經調為度治血熱氣虛經候不調血聚四肢或為浮腫肌體發熱疑為癆瘵宜此藥滋養通利之

紅花當歸散寄奴牛膝紫葳白芷蘇肉桂去皮甘草芍月

經若秘可通衢

紅花白芷肉桂各一分半當歸牛膝紫葳蘇木甘草各二分蜀寄奴五分赤芍

九分為末每二錢熱酒下經開紅花煎湯下治血臟虛竭經候不調或斷續不來或積瘀塊腰腹痛肢體瘦弱

紫葳散肉桂當歸赤芍白芷牡丹皮玄胡寄奴皆等分紅

花少入酒煎宜

紫葳肉桂赤芍藥玄胡索白芷牡丹皮當歸蜀寄奴各等分酒一水二入紅花

少許煎服治婦人月

水不行發熱腹脹

玄胡索散蓬莪朮當歸酒浸共三稜月水不調紅花使更

兼童便酒煎行

玄胡索、莪朮、當歸、三稜、各等分，為末，每

調童便紅花煎酒調服。治婦人氣血走作，疼痛不可忍，及月水不調，面色痿黃，飲食減少，產後諸疾。

太玄胡

索

散歸木香

稜莪

芍藥

桂芍

芩梗

太黃藥

紅花甘草性多涼

玄胡索、莪朮、當歸、三稜、赤芍藥、煨川、練肉、官桂、厚朴、木香、川芎、各一分半。

桔梗、黃芩、大黃、各五分，甘草一錢，檳榔二分，水煎，日三次，熱服。如惡物多，去大黃、官桂，加黃藥子、槐子、龍骨各五分。治婦人經病并產後腹痛，或腹滿喘悶，或癰疽瘰癧，鬼及一切心腹暴痛，平常人心胃急痛者，尤宜服之。

桂枝桃仁湯

生地黄芍藥

甘草半中良

經脉不通

繞臍痛

煎加姜棗莫商量

桂枝、桃仁、生地黄、芍藥、各一錢，甘草五、分，姜棗煎服。治寒客血室，月水不通。

繞臍寒疝作痛，或月候前，先腹痛，不可忍。

桑寄生散川續斷川芎當歸白朮伴香附阿膠神草參姜

煎溫服治經漏

桑寄生續斷川芎當歸白朮香附阿膠
扶神各五分甘草人參各二分半姜煎

服治胎漏及經血
妄行淋瀝不已

伏龍肝散艾石冬姜桂當歸草地芎單用龍肝芩地草白

朮阿膠治便血

伏龍肝六分艾葉川芎各一錢二分赤
石脂麥門冬各四分乾姜當歸各三分

肉桂甘草熟地各二分棗煎溫服或為末米飲調服治
血氣勞傷衝任脉虛經血非時注下或如豆汁或成血
片或五色相雜及血崩赤白帶下臍腹冷痛經久不止
一方單用伏龍肝八分黃芩生地甘草阿膠白朮各三
分水煎溫服治先便
後紅及吐衄血等症

解毒湯合四物湯八藥等分共煎湯經行不止崩不往寒

熱腹痛盡堪寧

鮮毒四物湯黃連黃柏黃芩山梔當歸川芎白芍熟地各一錢水煎溫服治婦

人經脉不佳或如豆汁五色相雜面色痿黃臍腹刺痛寒熱往來崩漏不止等症

四物承氣加朴硝此名玉燭散名標涼膈添歸用四物名

為三和散同條

牛膝散中用羚羊檳榔硝黃各一兩防已牡丹桂甘方通

經兼治脚氣腫

牛膝羚羊半角檳榔芒硝大黃各一錢防已牡丹皮肉桂甘草赤芍各五分水煎

溫服治婦人月經不通或脚氣腫痛

大腹皮飲防木瓜桑朴芪枳太黃加青陳五味子等分水

煎入酒一分花

大腹皮防已木瓜通瓜蒌仁桑白皮黃芪枳壳太黃青皮陳皮五味子厚朴各等

分水煎入酒少許調服

治婦人血癰單腹蠱脹

茯苓補心湯 治血虛兩分四物一參蘇感傷無汗與經閉

失血惡阻任意哺 即四物湯兩分參蘇飲一分姜煎溫服治心虛不能藏血咳嗽吐唾五心

煩熱及婦人經閉無汗潮熱有孕惡阻嘔吐等症

紫蘇飲極能安胎方藥川芎太腹哉當歸酒浸陳參草姜

葱煎服保仙懷 蘇葉芍藥川芎太腹皮當歸陳皮各五分

氣不和奏上心腹脹滿疼痛謂之 子懸及臨產驚恐氣結連日不下

安胎 八物去茯苓加上陳皮與黃芩蘇葉縮砂姜煎服

胎痛腰腹効可尋 當歸芍藥生地白朮各一錢人參用

芍藥陳皮各五十分紫蘇砂仁子芩甘草

各三分姜煎溫服治胎氣不安腰腹微疼飲食不美

固胎飲即八物湯去茯苓加桑樹羊苓栢連參煎糯米

虛阿膠旋化洋

生地川芎各五分歸身白芍陳皮人參各一錢白朮一錢半甘草三分黃連黃

栢各一分薛荔七葉即桑樹上羊兒藤糯米廿粒一方有黃芩五分水煎服如血虛不安者用阿膠痛者用砂仁止痛安胎行氣故也

達生散用蘇莖葉大腹甘草芩朮切歸芍參陳黃楊腦葱

煎宜服在九月

太腹皮甘草各一錢黃芩白朮芍藥當歸各一錢人參陳皮紫蘇各五分黃楊

腦一箇葱五莖水煎溫服懷孕八九箇月及稍虛者宜用春加川芎夏加黃芩秋加澤瀉冬加砂仁或俱加枳壳如氣虛加參朮氣實倍香附陳皮血虛倍當歸加生地性急多怒加柴胡食易饑多加黃楊腦腹痛加木香

胎動加
芋根

催生五積加烏附星香膠杏酒調助冬月破水後最宜生

胎死胎俱可墜

催生五積散蒼朮一錢桔梗五分陳皮
三分白芷桂心甘草川芎各一分半當

歸乾姜厚朴白芍茯苓半夏枳殼川烏附子南星各二

分木香半分阿膠杏仁各一分為末溫酒調下覺熱悶

加白蜜新冷水調服治胎死腹中產母氣乏產道乾澀

一方有麻黃無烏附星香止加杏仁阿膠其意以白芍

開子宮餘藥助氣開竅麻黃內通陽氣冬月用之血行

即產但破水二三白不產者即可催下若胎已死亦即

墜下未破

水者忌服

牛膝湯治胎中死瞿麥滑石冬葵子赤小豆當歸木通水

煎一服見懼喜

牛膝瞿麥赤小豆當歸木通各二分滑
石六分葵子四分一方無赤豆水煎溫

服治生產不順用此滑利水道令易產
如胞衣不下去瞿麥連進二三服即下

產後八味黑神散蒲黃熟地赤芍藥乾姜桂心甘草并黑豆酒

便調寧惡露注 黑豆四兩餘味各二兩為末每下一錢熱酒童使調服治產後惡露不盡胞衣不

下血氣攻心眩暈等症
一方去蒲黃加附子

三分散用小柴胡四物四君子同咀產後傷寒并痢者依

方取効似神扶

小兒

千金龍膽湯鈎藤柴芩梗方草茯苓大黃一分蜣一箇棗

湯調下鎮風驚 龍膽草鈎藤柴胡黃芩桔梗赤芍茯苓甘草各半二分大黃一分蜣螂一枚為末

每一錢或五十分棗子煎湯調服治小兒初生臍風撮口
月內胎驚氣逆發熱者宜一方去蜣螂加人參川芎水

煎溫服ス治ス小兒

兒疳瘕病一

蝎梢餅蜈乳花蛇南星姜蠶等硃砂麝香減半磨化服驚

風關閉兼擦牙

蜈蚣一條蝎梢乳香白花蛇硃砂南星姜蠶各五錢麝三錢為末酒糊作餅

參或薄荷煎湯磨化一餅治小兒驚風撮口驚風掣瘕

反張不納乳食四服盡冷牙關緊者用此擦牙尤妙

脫申散用麻黃根柴歸知母龍膽草參芍甘茯苓第入感

寒發熱痛頭腦

麻黃柴胡當歸知母龍膽草各二分人參川芎各二分茯苓二分半甘草四分

姜葱煎服治小兒發熱頭疼日久不痊如表不解加麻黃裏不解加大黃

紅綿散天麻黃蝎荆芥甘草發散多入裏須加大黃類驚

搐加蟬紫薄荷

天麻麻黃全蝎荆芥甘草一方無荆芥有大黃白附子蘇木各等分水煎湯服

量兒大小加減治

小兒夾驚傷寒

加減紅綿散

即本方去甘草加蟬退
紫草薄荷各等分葱煎

溫服治痘感風寒

發熱驚搐等症

人參羌活散

枳梗芎藭柴前獨草充地骨天麻偏減半

感冒疹痘盡可攻

羌活獨活柴胡前胡枳壳桔梗人參
茯苓川芎甘草各五分地骨皮天麻

各二分半薄荷一葉羌活煎服治小兒感冒四氣及疹
痘風痰壅盛煩熱作渴頭痛項強遍體拘急四肢頭疼

惺惺散即四君子薄荷芎藭梗細瓜蒸熱風寒并痘疹水

煎一服小兒

誇人參白朮茯苓甘草白芍桔梗瓜蒌根
川芎各五分細辛一分薄荷半生薑

煎溫服治變蒸發熱或傷風寒時氣頭疼咳嗽痰涎鼻
塞聲重氣壅清涕吐熱目溢多睡及欲作痘發熱頭疼

加減惺惺散蒼朮荊防芎藭細辛羌活甘草當歸天花粉赤

芍藥荷桔梗良

連翹飲即八止散去蓄大黃加芍歸荆防勞冬柴蟬退竹

葉燈心表裏宜

治小兒膈熱眼目腫赤唇口生瘡涕唾稠盛驚風痰熱等症宜此常利小腸

觀音散即四君子加麴芪木蓮豆芷更加蝎麻與羌防慢

驚痰痰棗湯使

見七卷十九葉

銀白散亦四君子加芪霍扁蠶糯米天升白附與山香小

兒百病有湯使

見七卷十九葉

益黃

散

陳皮用一二兩青草丁訶各二錢每服水調補脾胃

一切痞嘔盡皆痊

陳皮一錢青皮甘草訶子各五分丁香二分水煎量兒大小加減服之治

脾胃虛寒嘔吐不止或泄瀉腹痛或客熱在內不思乳食因之神懶心脇膨脹顏色青黃慳慳不醒又治脾疳冷腹痛久冷瀉積瀉冷吐積吐交精吐乳慢驚等症神效

異攻散即四君子去甘加橘理胃脾治痘更湊木歸桂朴

丁香半附攸宜

白木茯苓各二錢人參橘皮各一錢半姜棗煎服治脾胃虛冷腹痛自利不食

○陳氏異攻散用參木茯苓橘皮加官桂厚朴丁香肉豆蔻各二分半附子半夏各一分半木香當歸各三分姜棗煎服治痘出欲瀉未瀉之間頭溫足冷腹脹瀉渴急服此藥能除風寒濕痺調和陰陽滋養氣血使痘易出易瀉不致致瘁

木香散大腹皮桂參訶荻前半夏青丁等分二錢姜煎服

痘虛熱渴用之靈

木香大腹皮桂心人參訶子赤茯苓前胡半夏甘草青皮丁香各二分姜

煎溫服治發痘疹身熱作渴如
不甚虛寒者二方去附桂丁香香

透肌散紫升甘等糯米煎吞發痘瘡去升加木通枳壳方

名四聖倒靨良見七卷
二十一葉

快斑蟬退紫草功白芍人參與木通甘草等分水煎服痘

出不快源史充見七卷
二十一葉

解毒防風湯地皮荊芥鼠粘芍枳芪等分水煎發痘瘡壯

熱氣弱用之宜見七卷
二十一葉

消毒飲內君牛蒡荊防甘草升麻黨熱加犀角與黃芩加

減在賦曾修纂牛蒡子一錢二分荊芥二分甘草四分
防風升麻各二分水煎溫服治毒飲藥

過壯熱心煩便秘痘疹難出未
能為透餘毒亦宜便利者忌之

犀角消毒飲

即本方加犀角

黃芩治內蘊邪熱咽膈不利壅嗽眼臉腫腮癰結按腫
壅毒聚遍身疹赤瘰及痘疹已出未出不能快透或
欲出已出熱尚未解急進三四服快透消毒大人亦宜
此與賦內消毒飲稍異皆古方以賦內纂有加減故耳

外科

黃連消毒羌獨茂芩栢防藁草參歸翹梗地知蘇橘澤腦

背尻臀太陽宜

內有防風防已

內托羌活湯酒栢茂防歸藁連翹摘甘蒼陳桂水酒煎太

陽豚臀此方擇

三方見卷二四葉

白芷升麻湯桔梗甘草紅花蓄芪逞酒芩生芩水酒煎陽

明臂上癰疽省

見卷二四葉

肉托升麻湯葛根翹苳歸鼠肉桂君甘草黃柏煎入酒乳

癰頭瘡効若神見七卷二四葉

十味中和湯菖蒲牛蒡羌芎防漏蘆荊麥煎胡甘草等能

消鬢脇膽之毒見七卷二四葉

八味逍遙散歸芍苓朮柴草牡施略血虛火盛少陽癰乳

脇頸項盡堪嚼見七卷二四葉

肉托莖柴湯歸翹土瓜根共羌桂饒生地黄栢半酒水腿

內膝股太陰調亦治厥陰見七卷二四葉

附子六物湯防已肉桂苓朮甘草耳姜煎專治足太陰流

注臂腫無不已

見七卷
二五葉

內托酒煎湯歸芪柴翹肉桂大力皂升芷栢甘水和酒腎

經腿脛濕寒移

見七卷
二五葉

瀉心湯中用大黃參連施翹漏蘆良澤蘭蘇木各等分水

煎癰毒可通腸

見七卷
二五葉

龍膽瀉肝湯澤瀉車前木通生地亞歸施參草白水熬肝

經濕熱多腿罅

見七卷
二五葉

清肝湯即四物湯加柴施牡去地黃血虛怒火最能消百

般加減賦多方

見七卷
二五葉

內疎黃連涼膈意加木香連檳榔歸瘡腫發嘔太便燥脉

洪實者微利之見七卷

活命飲甘芳芷風歸天花皂刺貝母隨金銀花乳陳沒藥

木黃穿甲酒煎宜

甘草節赤芍白芷天花粉貝母乳香各一錢防風七分歸尾皂角刺陳皮

各一錢半金銀花三錢沒藥五分木黃五錢穿山甲三片用好酒瓦罐煎密封罐口勿令泄氣煎熟隨瘡上下飲之服後再飲酒二三盃側卧而睡忌酸物鉄器此藥不動臟腑不傷氣血凡一切癰毒瘡瘍未成者內消已成者即潰排膿止痛消毒之聖藥惟已潰者忌用如在背皂刺爲君在腹白芷爲君在四肢金銀花爲君在胃加瓜蒌仁二錢疔瘡加紫河車草根三錢惟便調者宜去木黃

五香連翹湯麝香乳丁沈木香木黃通草寄生川獨活甘

草升麻扁竹涼

連翹扁竹根大黃桑寄生獨活木通升麻丁香各七錢沈香青木香各二錢半

生甘草乳香麝香各一錢半每四錢水煎熱服以利惡毒為度一方有竹瀝芒硝隨熱輕重加減治一切積熱

結核瘰癧

癰疽瘡癤

內托復煎散地皮苓芍參苓桂黃芪兩防兩木歸甘草蒼

朮先煎餘次之

地骨皮黃芩白芍人參茯苓肉桂黃芪防己當歸甘草白朮各一兩防風三兩

蒼朮一斤先以水五碗煎蒼朮至三碗去渣入餘藥再煎至四盛取汁終日飲之其查亦如前煎汁飲之治陰

疽癰毒蘊結於中常服托裏健脾大藥冬月內托宜十宣散夏月及有熱者宜此多服最妙

流氣參歸芪梗風木香甘枳芍川芎桂槓芷朴蘇烏藥流

注傷寒不見縱

十六味流氣飲人參當歸黃芪桔梗防風木香甘草枳壳芍藥川芎肉桂槓榔

白芷厚朴紫蘇烏藥各等分一方無檳榔肉桂有卓角
 刺水煎溫服浴無名惡腫癰疽等疾此表裏氣血藥也
 非脉洪緩沈遲
 緊細者不宜用

升麻和氣飲半歸蒼朮梗陳甘枳壳姜葛芍大黃并白芷

燈心十五治諸瘡

升麻蒼朮桔梗各一錢半夏當歸茯苓白芷各二八分陳皮甘草各一錢半

乾姜枳壳各半分芍藥七分半乾葛二錢大黃五分生
 姜五片燈心十五根煎服治四肢瘡疥痛痒不常增寒

發熱陰下
 濕痒並治

內托十宣散參芪歸朴梗桂芍防芷草十味為末酒調之

癰疽加減如珍寶

人參黃芪當歸厚朴桔梗肉桂川芎防風白芷甘草各等分或加忍冬藤

尤妙如天熱去桂加瓜蒌根赤茯苓為末每二錢至五
 六錢不飲酒者木香磨湯調下瘡愈服之尤佳治一

瘡疽癰癤已成者潰未成者散敗膿自出無用手擠惡肉自去不犯針刀服藥後疼痛頓減排膿生肌其効如神小兒痘疹亦宜用此托裏

天頭病

普濟消毒

飲芩連犀參陳甘梗玄藍幾翹升柴馬姜蠶同

或加防薄芎歸耳大便硬者又加黃煎湯調末隨入使

黃芩黃連各五錢犀角片子馬勃藍根連翹各一錢人參三錢陳皮生甘草桔梗玄參柴胡各二錢升麻姜蠶各五分爲末白湯調時時服之留三半蜜丸含化或加防風薄荷川芎當歸水煎服或太硬加酒太黃一二錢以和爲度治天行太頭病頭面腫盛目不能開上氣喘急咽喉不利舌乾口燥此邪熱客於心肺上攻頭目互相傳染害人甚速

清震湯治雷頭風升麻蒼朮一兩充蓮葉一荷煎水服腫

痛寒熱立收功

每服五錢水煎食後徐徐溫服治雷頭風頭面疔瘡腫痛增寒發熱四肢拘急

症似傷寒蓋雷屬震震仰于孟故藥內加

青荷葉謂象其震之形狀也宜此主之

升麻調經湯葛龍吟連栢梗連翹空我梭歸芍甘草輩少

陽加柴癰無縱

內有生芍酒茶見七卷二十八葉

肺癰

桔梗湯中用防已百合貝母瓜蒌子甘節參歸杏苡仁桑

白黃芪姜佐使

桔梗防已貝母瓜蒌仁人參當歸意以仁桑白皮各四分百合甘草節杏仁黃

芪各一分姜煎溫服治肺癰咳嗽膿血咽乾多渴如大便秘加大黃小便赤加木通

知母茯苓湯黃芩五味欬冬半木參梗麥柴薄芎膠草夜

嗽歸地藥宜增

知母茯苓黃芩各一錢五味子欬冬花桔梗麥門冬柴胡各五分人參半夏文

七分薄荷三分甘草白朮各六分川芎阿膠各四分生
姜煎服治肺癰喘嗽不已往來寒熱自汗如夜嗽甚加
當歸

肺痿
地黃

紫苑散中知貝母參梗茯苓阿膠許甘草五味生薑煎善

治虛咳成肺痿見七卷

人參平肺散

桑皮君知草地骨五味群青陳半茯苓門冬

姜煎為丸要搗勻

桑白皮一錢知母七分甘草地骨皮
陳皮各五分五味群粒茯苓青皮人

參天門冬各四分如熟加黃芩四分紫蘇半夏各五分
姜煎溫服或為末姜汁糊丸彈子大食後噉化治心火

利如平後熱聲嘶加杏仁桔梗有膿血將變癰加紫苑
肺癰

神効瓜蒌用一箇當歸甘草五錢挫乳沒一錢酒水煎乳

脇腸癰功莫過見七卷三二葉

腸癰

大射干湯赤茯苓赤芍白朮及槐升水煎入蜜地黃汁胃

癰甲錯自然清見七卷三三葉

腸癰

大黃湯偏治腸癰硝牡瓜蒌桃仁同虛去硝黃加醬意立

止寒熱與消膿敗醬意或仁見七卷三三葉

痔

五痔散用猪鬃甲蛇退蝟皮蜂房挾每服二錢少入麝不

拘内外并冷熱猪左懸蹄甲鬃甲蝟皮露蜂房各五錢蛇退一條俱炒焦為末每二錢入麝少

許并水調服治五痔不拘内外冷熱如牡痔倍鬃甲牝痔倍蝟皮腸痔倍猪甲血痔倍蛇退脉痔倍蜂房

鶴膝風

大防風湯熟地黃白朮參茸芪附羌牛膝杜仲歸甘芍荆

後鶴膝空心膏

熟地、白朮、防風、當歸、白芍、杜仲、黃芪各四分，附子、川芎各三分，牛膝、羌活、甘草

人參各二分，丁方無羌活有茯苓、姜、棗煎服。去風順氣，活血壯筋，治足三陰經虧損，外邪乘虛患鶴膝風，或時骨節腫痛，或腫而不痛，不問已潰未潰，用三五劑後，當用調補之藥，或痢後脚痛，緩弱不能行履，名曰痢風，或兩膝腫痛，脚脛枯，腊亦名鶴膝風。

癰瘡

何首烏散、蔓荊芥、蚬蚸、甘草、歲防、丹湯酒，每服抄二錢，能

治癰風頑癰

見七卷三十八葉

浮萍散治諸風痒，荆芥、川芎

甘草、麻黃、赤芍、當歸各等分

葱根、豆豉共煎湯

折傷

復元活血湯

當歸、柴、將軍、穿甲、紅黃排、瓜、蔓、挑仁煎酒水

墜跌脇痛効難猜

當歸一錢二分柴胡一錢穿山甲其草紅花瓜蒌根各四分酒大黃二錢

桃仁泥十枚水酒各半煎服以利為度治從高墜下惡血留於脇下實痛不可忍者宜服

當歸鬚散有紅花桃仁甘草赤芍烏藥香附蘇木桂水

酒煎治折傷家

見七卷四四葉

乳香定痛散歸木白芷沒藥羌活足甘參為末調酒便專

醫墮墜并跌撲

見七卷四四葉

破傷風

如聖散中香白芷川芎防風細辛使雄黃蒼烏兩頭尖熟

酒調之忌油膩

白芷川芎防風細辛各五錢雄黃二錢半蒼木二兩草烏四錢兩頭尖四錢一

方加當歸麻黃荆芥何首烏全蝎天麻藁本各五錢茸草二兩人參二錢川烏四兩石斛一兩為末每一錢酒

卧茶清或熱酒少許調下忌一切動風油膩熱物
癱右癱半身不遂口眼喎斜腰膝疼手足麻言諸濕通
身癱上攻頭目耳鳴疼涎不利偏正頭痛一切諸風及
破傷風角弓反張此大乃力所傷諸風濕等瘡及婦人
產後敗血衝上並宜服之又可敷貼破傷處
風牙疼乾擦即愈如損骨者加乳香二錢

養血當歸地黃湯川芎芍藥藥本防白芷細辛煎水服破

傷虛者急宜聲見七卷
總方
四十七葉

四君子湯參苓朮甘草姜棗煎要熱氣虛用此古今同合

上四物八物足見七卷
五十六葉

四物湯地芍芎歸血病須還血藥醫更有赤芍當歸屠小

芍生地始相宜見七卷
五十七葉

二陳湯要橘半陳茯苓甘草姜煎溫血虛合上四物藥氣

虛更宜合四君見七卷五十八葉

六鬱湯陳皮半夏茯苓蒼朮砂仁充山桅香附子甘草

姜煎加減在心中見七卷五十九葉

右方詩三百首捷徑八十七首新增二百一十三首其間等分遵古未及校止用者因病加減不必拘泥即如清脾飲治熱多寒少當以柴胡黃芩為君餘藥為佐豈可九味皆等分耶又如六味地黃丸補腎固以地黃為君若病水腫當以澤瀉為君病遺精當以山茱萸為君九藥亦可煎湯湯散亦可作丸膏藥間有可服者丸散亦有可外敷貼者存乎人之善悟耳

方詩終

○急救諸方

萬病解毒丹乃急救通用妙劑外傷內傷
縊死溺死皆驗萬病解毒丸中諸盡皆驗

救縊死

自旦至暮但心下微溫雖一日以上可活急抱死
死久將繩實解去切不可割斷極須按定其心却

撚正喉龍放倒卧令一人以手掌掩其口鼻兩人吹其

兩耳一人急牽其髮不放手及屈伸其手足摩捋之少

活即以粥飲與之此法救人無不活者○又

法男用雌雞女用雄雞冠刺血滴口中即活

救溺死

先以刀拭開口放筋一根嚼之使可出水然後解
去其衣服以艾炙臍中令兩人以筆管吹其耳即

活或以生人到獸死處即負持走吐水便活外用綿裹

皂角末納穀道中水出即活內以鴨血灌之○又法用

酒鑊一箇以紙錢一把燒鑊中急以鑊口覆死上面

或臍上冷則再換水出即活如甦即用蘇合香丸擦牙

救凍死

其症四肢強直口緊只有微氣者且慢向火急用

酒或米飲灌之冬

月墮水凍死亦宜

救魘死

原有燈即得如無燈切不可用燈急用竹管吹其兩耳或通關散吹入鼻內或以鹽湯灌之或用韭

菜搗汁滴入鼻中空中惡死亦宜或到客舍官驛及

久無人居冷房睡中為鬼物所魘但聞其入吃吃作聲

多人叫喚如不甦不急救則死用牛黃雄黃各一錢硃

砂五分為末每掛一錢燒於床上一錢用酒調灌之

救墜死

墜下瘀血衝心欲絕者用豆豉濃煎湯服若便覺氣絕不能言取藥不及急拔開口以熱小便灌之

救絞腸痧

即腹痛難忍但腰沙腹痛而手足冷看其身上紅點以油燈心點之即愈陽沙腹痛而手

足煖以針刺其十指背近小甲半分許即動小甲而指

背皮肉動處血出即安仍先自兩臂將下其惡血令聚

指頭血出為好

解砒毒

其症煩燥如狂心腹攪痛頭旋欲吐不吐面青黑四肢逆冷此毒於肉筋中得之則易治飲酒中

得之則難歸一百脉難治在胃臍用芩帶稀涎散吐之在

腹中急服萬病解毒丹下之或大承氣湯加雄黃青黛

等分畧煎冷服徐服參合白朮散仍忌鷄鶩肉數日
一方用早禾稗燒灰并水淋濃濃冷服一碗其毒下利
即愈或用麻油或人糞汁皆可灌之一方施
刺羊血或鷄鴨血熱服兼解鼠莽毒及丹藥毒

解川烏附子毒

心煩躁悶甚則頭空冷然遍身皆黑勢危
必死煎萊菔或黑土旦冷飲或防風甘草煎

湯冷服一切藥毒及犯熱物亦宜但要心間暖者不妨
朱子集云緊急無藥令多汲新水連飲大嘔瀉而愈

解巴豆毒

令人大瀉或吐煩渴發熱急用黃連黃柏煎湯
冷服更以冷水浸手足掌忌食熱湯熱性藥物

解諸草毒

治誤食毒草并百物毒救人於必死救藍根四
兩貫眾青蘗生甘草各二兩為末蒸餅丸梧子

大另用青蘗為衣如覺精神恍惚惡心即是
誤中諸毒急取十五丸鹽爛新汲水下即解

解豆腐毒

過食令人生瘡暖氣遺精白濁用
生薑蘿蔔煎湯服或子煎湯亦可

解諸菌毒

掘新地取直黃土以冷水於內攪之令濁澄少
傾取飲之可解亦治楓木菌食之令人笑不止

又方用荒花生為末每二錢新汲水下以利

為度菌之毒者蓋因蛇虫毒氣熏蒸所致

解鼠莽毒 用大豆煮汁服之如欲試其驗先刈鼠莽苗葉以汁澆其根從此敗爛不復生發矣

解鵪鴉毒 卽孔雀毛并膽也用乾葛為末水調服○食鵪鴉中毒以糯米泔溫服卽消

解六畜肉毒 用犀角磨濃汁一碗服之○食自死六畜毒用黃柏末一二錢服之不解再服

解河豚魚毒 一時因急殺人急用清油吐出或服槐花末龍腦末皆可○食寶丹尤妙諸魚毒橄欖解之

解斑猫毒 其症吐逆不止急用萊菔或烏豆或糯米煎湯服一方用澤蘭葉搗汁服或乾者為末白湯下

解鱉蟹蝦蟆毒 用生豆豉一合新汲水半碗浸汁頓服卽愈此三物令小便秘澀下蔽痛有發死者

解中金蠶蠱毒 絕覺中毒宜先吮白礬末其而不瀝次嚼黑豆不腥者是也用石榴根皮煎濃汁飲

之卽吐蟲活

民無不愈者

解中諸物毒

由紫細茶等分爲末每三錢新汲水調服得吐即効未吐再服或萬病解毒丹丸下之

解中毒

及蛇虫咬癰疽總作服此毒氣不聚用青黛蘇黃各等分爲末新汲水下二錢

誤吞銅鐵碗

萬病解毒丸大黃大戟連翹寒水石各一兩白芷替白芷黃芩茯苓石羔滑石天花

粉各三兩甘草薄荷乾葛各四兩山茨菰六兩貫衆一兩半青黛五錢爲末菜豆粉糊丸彈子大每服一丸薄

荷湯磨下治一切中毒能化銅鐵碗在口嚙化爲粉碎此其驗也抑論中毒之症辨其自戕被害何物之中審

其遠近又則不救治法上宜吐之以鴉翎探吐急以桐油灌吐之下以解毒丸散漿利之中毒手足面青過時

者不救緊急只以玄明粉煎甘草湯利之亦可

誤吞鐵針

用蠶豆煮熟同韭菜喫下針與菜從大便而出

誤吞銅錢

不能化者用砂仁煎濃汁飲之其銅自下或用聖炭爲末米飲

調服於大便中

瀉下如烏梅狀

誤吞蜈蚣

用生猪血令病久喫須臾生清油灌口中惡心其蜈蚣衣在血中吐出繼以雄黃為末水調服

誤吞水蛭

入腹經久必生小蛭能食人肝血腹痛不可忍面自黃瘦全不進食若不早治能令人死用田

中乾泥一小塊小死魚三四箇將猪脂溶攪勻用巴豆十枚研爛入泥內為丸菉豆大用田中冷水吞下十丸

小兒三五丸須臾大小水蛭一時皆下却以四物湯加黃芪煎服生血補脾

骨鯁入喉

用砂仁甘草等分為末以綿裹少許燕之良久骨隨痰出甚者用南硼砂少許水洗汲口中含

化立愈一方用金鳳花子或根或魚骨鯁諸四卷百三葉水漱口免傷齒雞骨尤効

獸骨鯁用象牙梳磨水嚥下或桑木上取屑水醋灌自下或狗涎灌之以狗善食諸骨也

禾芒刺喉

或口舌中取雞涎灌之即下以藕善消稍芒也

虎咬

先喫清油一匙次用油洗傷處或白礬為末納

馬咬

及踏傷人用艾炙傷處并腫處或用
人屎或馬屎燒灰為末皆可敷之

犬咬

風犬咬用防風五錢牽牛大黃各三錢斑蝥一錢麝
香三分雄黃二錢半為末每三錢遇傷時滾水調服

利下惡物從小便而出○薏犬咬及常犬咬用虎脰骨
或腦骨為末每二錢熱酒白湯任下○一方用白礬為

末糝麥丹用斑蝥九枚為末酒
調服利下惡物從小便出即愈

蛇咬

急飲好醋二碗令毒氣不隨血走或清油亦可○
方用貝母為末酒調令患人盡醉飲之頃久酒自傷

處為水流出候水盡却以藥渣敷上若傷至垂死但
有微氣服此即活○惡蛇咬用細辛白芷各五錢雄黃

二錢為末每二錢入麝香少許溫酒
調服○誤飲蛇交水研雄黃服之

鼠咬

貓毛燒灰入麝香
少許津液調敷

蜈蚣咬

用鷄屎塗之良。一方用蜈蚣咬去其毒待

蜘蛛咬

用醋磨姓鉄汁或桑白皮汁塗之。治蜈蚣咬。

壁虎咬

毒人必死。用桑柴燒灰以水煎三四沸。濃汁調白礬末塗傷處。兼治蛇咬。

蚯蚓咬

用鷄屎塗之。又方急煎薑湯洗浸腫處即消。

八脚虫傷

其虫隱於壁間。以桑射入。適體生瘡。如湯火傷。用烏鷄翎燒灰爲末。鷄子白調敷。

蝎子螫

痛不可忍。用白礬半夏各等分。爲末。醋調塗之。痛止。

黃蜂螫

用熱油洗之。清油擦之。亦可。或用頭垢敷。或用鹽擦。

溪毒

兼辟射工。夏月出行。取知母爲末。自隨。欲入水先取少許。投上流。亦取服之。一方用蒼耳子搗汁服之。

○已上有自取者。有誤犯者。其實人身難得。豈可尚氣。縱情而輕棄其生耶。凡有生者。慎之戒之。

避難止小兒哭法

用綿為一小絨隨兒大小為之畧使滿口而不致閉其氣量用甘草煎湯或甜

物皆可漬之臨時縛置兒口中使匝其味兒口有物實之自不能作聲而躁較不傷兒口此宋劉跂暇日記方也
在瓊山云此法平世誠無所用不幸而遇禍亂全活嬰兒之命不可勝記蓋嬰兒未解事者不可戒語啼聲不止又恐為盜賊所聞勢不得已棄之道旁哀哉此法雖小不可不知

避難大道丸

黑豆一升去皮貫仲甘草各一兩茯苓薯蓣砂仁各五錢剉碎用水五盞同豆熬煎火須

文武緊慢得中直至水盡揀去藥取豆搗如泥作芡實大磁瓶密封每服一丸則添食苗藥可為益日飽雖異草殊木素所不識亦無毒其甜與蔗同類一同事備荒亂饑我食草木以濟生一方只黑豆一升按法淨洗貫仲一片紙剉用水斟酌多少慢火煮豆香熟日乾翻覆全展盡餘汁絞取黑豆去貫仲空心日嚼五七粒任食草木無妨治與前同能忌魚肉菜果及熱水熱湯數日後身力壯健不復思飲食

散被毆癰痕亦治跌撲用熟麻油與酒同煎服之服之火燒地上疼痛即消

傷重痛悶欲絕者用牛一隻剖腹納其人于牛腹浸熱血中可甦如傷腹用血竭飲之出血愈或

打傷跌撲或戰陣砲矢所傷血流滿體氣貫胃腸閉絕者亦甦

治中割血出亦治金瘡用原蠶蛾一味炒為末敷之立止血出如箭者亦効

鎗傷腹裂腸出者用黃芪當歸川芎白芷續斷鹿茸黃芩細辛乾姜附子各藥各一二兩為末先飲

酒次服五錢七日三服加至方寸七立驗傷重困乏者亦宜

金刃中骨脉中不出者用白蠟半夏等分為末每方寸七日三服酒下至廿日自出

下蚕室創口不合方用所割勢火煨為末酒調服昔有沈生者狎近女冠或發白其師沈懼引

刀自割其勢瘡口流血經月不合或發以下煨所割者搗為末酒調服不數日而愈急救方終

○恠疾

項上生瘡

如櫻桃大有五色瘡破則項上皮膚但逐日飲牛乳自消

四肢堅硬

寒熱不止經日後四肢堅如石以物擊之似鐘聲聲日漸瘦惡用茱萸木香等分煎湯服即愈

大腸頭出

寸餘痛苦直候乾自退落又出各截腸病若腸盡不治但初截寸餘可治用芝麻油器盛之以

腎坐之飲大麻子汁數盞即愈

口鼻流水

口鼻中腥臭水流以碗盛之有銀色蝦魚如梗米大走躍不住以手捉之即化為水此肉壞矣

任意饌食

雞肉自愈

兩足心凸

如腫上面生黑色豆瘡硬如釘子履地不得脛骨生碎服髓流出身發寒顫惟思飲酒此是肝

腎氣冷熱相吞用炮川烏末敷之煎韭子湯服之効

腹脹忽瀉

腹脹經久忽瀉數升晝夜不止服藥不驗乃為氣脫用益智仁煎濃湯服立愈

腹上麻痺

不佳多煮葱白食之自愈

四肢節脫

但有皮連不能舉動各日筋解用黃芪二兩以酒浸一宿取出焙乾為末每二錢酒下服盡安

玉莖堅硬

不痿精流無歇時時如針狀挫之則脆乃為腎滿漏疾用韭子破故紙各一兩為末每三錢水

煎日三服愈則停服

喉間生肉

脅脅相疊漸癰腫起不痛多日乃有竅子臭氣自出遂退飲食用臭橘葉煎湯連服自愈

腹中如鐵

石臍中水出旋變作重行之狀縛身匝緣非痛難忍翎毛撥掃不盡外用蒼朮煎濃湯浴之內

用蒼朮為末入麝香少許水調服之即愈

眼見虫飛

眼前常見諸般禽虫飛走以手捉之則無乃肝膽經為疾用酸棗仁羌活玄明粉青箱子花各

煎和查飲一日三服

大腸虫出

不斷斷之復生行坐不得用

眼睛垂出

至鼻如黑角色痛不可忍或時時大便血

腹中作聲

腹中有物作聲隨人語言用板藍汁一盞

喜飲清油

五碗以來方始快意常得助即安不爾則病此

為未水調服其虫自出如虫活者置

臥床能食

卧於床上四肢不能動只進得食好大言說

喫猪肉一項病者聞之即喜遂置肉令病人見臨要

十指節斷

身綠毛各日血餘用茯苓胡黃連煎湯飲之愈

通身皮響

通身忽皮底混混如波浪聲痒不可忍抓之血出亦不能解謂之氣奔用人參苦枝青鹽細辛

各一兩作三服水煎十

數沸去渣食盡便愈

眼白渾黑

眼白瞋人渾黑見物依舊毛髮直如鐵條雖能飲食不語如醉各日血漬用五靈脂為末每二

錢溫酒調

服白愈

肉片能飛

因著文久訖大痂便退落瘡內鮮肉片子飛出形如粉蝶騰空去了痛不可忍此乃血肉俱熱

用大黃朴硝各五錢為末水調下微利即愈

多風號哭

臨卧渾身風出約至五盞隨至血肉俱壞每宿漸多痒痛不可言狀雖喫水卧床晝夜號哭舌

尖出血不止身齒俱黑唇動

鼻開但飲鹽醋湯十數即安

眼赤鼻張

大喘渾身出莢毛髮直起乃熱毒氣結於下焦用白礬滑石各一兩為末作一服水三碗煎至

平令不住飲
候盡乃安

皮下虫走

有虫如蟬走於皮下作聲如小兒啼為肌肉之
化用雷丸雄黃各一兩為末糝在猪肉片上灸

熟喫盡

自安

鶴虱共

甲生肉刺

手足甲忽然長倒生肉刺如錐
痛不可忍但煮葵菜喫自愈

鼻中毛出

晝夜可長一二尺漸漸粗圓如繩痛不可忍雖
忍痛摘一莖即後更生此因食猪羊血過多所

致用乳香硃砂各一兩為末飯九桐子大
空心臨卧各一服水下十九自然退落

瘡似猫眼

面上及遍身生瘡似猫兒眼有光彩無膿血但
痒痛不常飲食裁少久則透脛名曰寒瘡多喫

魚雞非

葱自愈

脇破腸出

臭穢急以香油摸腸用手送入煎人參拘
杞淋之皮自合矣喫羊腎粥十日即愈

口鼻氣出

盤旋不散疑如黑蓋色過十日漸漸至有骨肉相連堅如金石無由飲食多因瘡後得之澤

渴煎湯日飲三
盞連服五日愈

肉出如錐

遍身忽然肉出如錐既痒且痛不能飲食此名血壅若不速治潰而膿出以赤皮葱燒灰淋洗

喫豆豉湯

數盞自安

眉毛動搖

目不能視交睫喚之不應但能飲食有經日不効者用蒜三兩取汁酒調下即愈

毛竅血出

節次若血不出皮膨脹如鼓須臾眼鼻口被氣脹合此名賊盜飲生薑汁水各一二盞即安

氣喘不言

忽然氣上喘不能語言口中汁流吐逆齒皆搖動氣出轉大則悶絕蘇復如是名曰傷寒併熱

霍亂用參木黃各

五錢水煎熱服即安

口內肉起

口內生肉起臭惡自已惡見有根線長五寸餘如銀股吐起出以飲食了却吞其線以手輕捏

痛徹於心因不可言用麝香末一錢水調服三日即驗

瘡內有石

渾身生瘡如燎泡如甘棠梨每箇破出水內有石一片如指甲大泡復生抽盡肌膚肉不可治

急用三稜莪朮各五兩為末分三服酒調連進即愈

頭面發熱

頭上面上發熱有光色他人手近之如火燒久用蒜汁五錢酒調下吐如蛇狀遂安

自覺自形

作兩人並卧不別真假不語問亦無對此乃離魂用辰砂人參茯苓煎服真者氣爽假者自化

善飲致羸

男子自幼喜飲酒至長成日飲一二斗不醉片時無酒叫呼不絕全不進食日就羸弱令其父

用手巾縛住其手足令勿動搖但扶少立却取生薑酒

一壺就於其子口邊打開其酒氣衝入口中病者必欲

取飲堅不可與之須臾口中忽吐物一塊直下壺中即

用紙封壺口用猛火燒滾約酒乾一半即開視之其

一塊形如猪肝約三兩重周圍有小孔如針眼不

可數計棄之江中飲食復舊雖滴酒不能飲矣

穿斷舌

自行被跌穿斷舌心出血出不止用鷄翎蘸米醋
末蜜調成膏
斷斷處其血即止仍用蒲黃杏仁礪砂少許為
醫化而安

浮腫如蛇

身上及頭面肉上浮腫如蛇狀者用雨滴皆
磚上苔痕一錢水化開塗蛇頭上其腫自消

煙薰欲死

炭烟薰人往致死口中含蘿蔔一片烟氣不
能毒人或晒乾為末備用亦可或新水插爛乾

蘿蔔飲之亦可凡居民逃被石室中賊以烟
火薰之欲死迷悶者與蘿蔔嚼汁下咽而甦

心疼欲死

牙關緊急者用隔年老葱白三五根去皮發葉
搗為膏將病人口拭開用銀銅匙將葱膏送入

喉中用香油送下但得葱膏下喉即甦少時
腹中虫物化為黃水利下除根永不再發矣

五戶惡病

飛尸者遊走皮膚穿入臟腑每發刺痛變作無
常遁尸者附骨入內攻鑿血脉每發不可得近
見尸喪聞哭哀便發風尸者淫濯四肢不知痛之所在
每發昏沉得風雪便作沉尸者纏骨結藏衝心脇每發

如痛遇寒便作注戶者舉身沉重精神錯雜常覺昏廢
每節氣至變輒成太惡皆宜用忍冬葉剉數斛煮令濃
取汁煎之服如鷄子大一枚
日三次或蘇合香丸並佳

卒中惡忤

中惡中忤鬼氣其症暮夜或登廁或出郊野或
遊空冷屋空室或人所不到之地忽然眼見鬼物
鼻口吸著惡氣墓然倒地四肢厥冷兩手握拳鼻口出
清血性命危巡須臾不救與尸厥同但腹不鳴心脇俱
冷凡久切勿移動即令親眷眾人圍繞打鼓燒火或燒
麝香安息香蘇木檀木之類俟甦方可移歸或內急用
生犀角剉末五錢硃砂麝香各一分為末每
二錢新汲水調灌體薄者桃枝葉煎湯下

鬼擊徹痛

卒被鬼擊如中箭忽一點痛如注不可忍用桃
皮一片將裏面濕處貼痛上取一匙頭安桃皮
上緊搓艾一團如胡桃大
安匙頭上艾火之須臾痛止

鬼擊吐血

夢中被刺殺或杖打諸般不祥卒然吐血衄血
下血甚者九竅皆有宜用升麻獨活續斷地黃

各五錢官桂一錢為末每二錢食前白湯調下日三服

淘井殺人

夏月不可淘井多致殺人五七月尤甚古塚及深塚中亦然皆有伏氣令人冒悶奄忽欲死即

取井水或他水澀其面并冷水調雄黃末一二錢服之轉筋入腹痛欲死者使四人捉住手足灸臍左邊二寸

十四壯又用生薑一兩酒五盞煮濃頓服又醋煮衣絮令微濕裹轉筋處又濃煮蒜湯通手浸忤疾手足洗胸

脇間即甦○凡入井塚須先以雞毛投之直下則無毒徘徊則有毒當先以酒數升洒井塚中停時然後可入

驚症不語

用密陀僧一味為末茶調服一七許有因入山被虎蛇所逐驚氣入心絡不語服此立効

血自皮膚濺出

用煮酒瓶上紙碎揉如楊花以手捏在出血處即止

咽塞呻吟不食

昔華陀見一人病咽塞食不下呻吟令取蒜薤并大酢三升飲之果吐蛇一條而愈

忤疾

△治法

○水火分治

此子和以臟腑分濕火比之以肥人寒濕生痰瘦人熱火生燥以形體分言者九精

肝膽由來從火治三焦胞絡都無異

也火內陰外陽主乎動也九動皆相火之為

天非此火不能生物人非此火不能有生天之火出於龍

雷則木之氣出於海則水之氣然雷非伏不能鳴龍非蟄

不能飛海非附地不能波鳴飛波皆動為火也人之火寄

於肝腎肝屬木腎屬水膀胱者腎之腑心胞絡者腎之配

三焦以焦言而下焦司肝腎之分皆陰而下也故皆從火

治然人火同天也而以為元氣之賊者人生恒動於欲相

火煽起煎熬真陰陰虛則病陰絕則死

此戴人及東垣明言不獨張子和然也肺胃常將濕麴求

肺與大腸同濕類

腸胃屬濕謂其水穀之海停濕聚水之鄉實而不滿脾動胃化上輸清氣此經

先得其濕金肺清高何屬濕論以其清氣上升則在

天為雲在人為氣濁氣下降則在為雨在人為濕腎與

膀胱心小腸寒熱臨時旋商議

心勞則傷其血腎勞則損其精精血一傷水火偏勝

陰陽兩虛寒熱時作若膽與膀胱實而不滿出而不入傷寒寒熱皆從此經而出言其治無定法者以其寒熱交差

治法不一也

惡寒表熱小腸濕惡熱表寒心腎熾十二經最端

的四經屬火四經濕四經有熱有寒時攻裏解表細消息

裏熱裏寒宜越竭表熱表寒宜汗釋濕同寒火同熱寒熱

到頭無兩說六分分來火熱寒寒熱中停真浪舌熱寒格

拒病機深尤則害兮承廼制

氣之來也既以極而成災則氣之乘也必以復而得平物

極則反理之自然姑以心火而言其不亢則腎水雖心火之所畏亦不過防之而已一或有亢即起而尅勝之矣餘臟皆然以人事言之我與彼亢則彼必害我我能承之則彼反爲我所制矣此借喻耳本論運氣勝復詳素問六微

論緊寒數熱脉正邪標本治之真妙訣休治風休治燥治
得火時風燥了當解表時莫攻裏當攻裏時莫解表表裏
如或兩可致後先內外分多少治濕無過似決川火常有餘水常
不足然火有餘者邪火也若真火護衛形骸灌漑臟腑得
之則生失之則死衰乏則病即真陽也豈能有餘水不足
者真水也若邪水泛溢經絡為腫痛麻痺痰癰瘡毒宜上
下分消猶如決川其間精枯血竭潮熱痿弱乃真水不足
心火獨炎宜滋陰補腎最忌滲利此治水之扣乘也此箇望蹄最分曉感謝軒岐萬
世恩爭奈醯鷄笑天小

○標本分治

標本之道要而博小而大不知標本是謂妄治

少陽從本為相火太陰從中濕土坐厥陰從中火是家陽

明從中濕是我太陽少陰標本從陰陽二氣相包裹風從
火斷汗之宜燥與濕兼下之可萬病能將火濕分掣開軒
岐無縫鎖

標本論

天陽無陰氣上外升生浮晝動輕燥六腑
地陰有方血下內降殺沉夜靜重濕五臟

夫治病者當知標本以身論之則外為標內為本陽為標
陰為本故六腑屬陽為標五臟屬陰為本各臟腑之經絡
在外為標在內為本更人身之氣為標血為本以病論之
先受病為本後傳流病為標凡治病者必先治其本後治
其標若先治其標後治其本邪氣滋甚其病益蓄若先治

其本後治其標雖病有十數症皆去矣謂如先生輕病後
滋生重病亦先治輕病後治重病如是則邪氣乃伏蓋先
治本故也若有中滿無問標本先治中滿謂其急也若中
滿後有大小便不利亦無問標本先治大小便次治中滿
謂尤急也又如先病發熱加之吐利大作粥藥難入略緩
治熱一節且先定嘔吐漸進飲食方兼治瀉待元氣稍復
乃攻熱耳此所謂緩則治其本急則治其標也推其至理
亦先治其本也除大小便不利及中滿吐瀉之外其餘皆先其本
不可不慎也假令肝受心火之邪是從先來者為實邪實

則瀉其子也。然非直瀉其火入肝經藥爲之引用。瀉火爲君是治實邪之病也。假令肝受腎邪是從後來者爲虛邪。虛則補其母入腎經藥爲引用。補肝經藥爲君是也。又經云：「工爲標，病爲本，但標本已得，邪氣乃服。」謂之標本不得謂醫工無失色脉用之，不惑治之，大則法若反理到行所爲弗順，豈惟治人而神氣受害，病者當去故醫逆理之人，宜就新醫，明悟之士乃得至真精曉醫以全已也。此二法乃治病之至理，誠醫之良規也。

○求本論

將以施其療病之法當以窮其受病之源蓋疾痰不離陰陽二邪風熱火病屬陽濕燥寒病屬陰苟不求其本而治之則陰陽邪氣滋蔓而難制矣久而傳變不勝其衆今夫厥陰爲標風木爲本風邪傷入掉搖痠痿卒暴強直之病生焉少陰爲標君火爲本熱邪傷入瘡瘍暴下水液渾混之病生焉少陽爲標相火爲本火邪傷入躁擾狂越如喪神守之病生焉善爲治者風淫所勝平以辛涼熱淫所勝平以鹹寒火淫所勝平以鹹冷以其病本於陽故必求其陽而療之太陽爲標濕土爲本濕邪傷入腹滿身腫諸瘕強直之病

生焉陽明爲標燥金爲本燥邪傷入臍鬲皺揭諸澀枯涸
之病生焉太陽爲標寒水爲本寒邪傷入吐利腥穢諸寒
收引之病生焉善爲治者濕淫所勝平以苦熱燥淫所勝
平以苦溫寒淫所勝平以辛熱以其病本於陰故必求其
陰而治之如是而病之不愈者未之有也六氣爲本三陰
三陽爲標蓋天
之三氣其氣自上而下在人足三陽經受之地之三氣其
氣自下而上在人足三陰經受之太陽寒水症其味浮而
緊緊者寒水本也浮者太陽標也發於三陽經急以辛熱
之藥攻本之緊佐以甘寒輕劑解標之浮由經入府又當
審脈之浮緊若緊去浮在是浮入府也以寒藥解之浮去
緊在是緊入府也以熱藥攻之浮緊不去是浮緊俱入也
仍以熱藥攻其本寒藥解其標發於三陰經急以辛熱之
藥攻本之緊佐以甘寒重劑解標之浮由經之藏又當審

之

脉之浮緊若緊去浮在是浮入臟也以寒藥解之浮去緊在是緊入臟也以熱藥攻之浮緊不丟是浮緊俱入也仍以熱藥攻其本寒藥解其標少陰君火症其脉沉而大大者君火本也沈者少陰標也發於三陽經則以辛寒之藥攻本之大佐以甘溫輕劑解標之沈發於三陰經則以辛寒之藥攻本之大佐以甘溫重劑解標之沈少陽相火症其脉浮而數太陰濕土症其脉沉而緩本末同故從本也厥陰風木症其脉沈而弦陽明燥金症其脉浮而短本末與中不同故不從標本從乎中也抑論治法各有其要豈止於一端而已其在表者汗以發之其在裏者下之奪之其在高者因而越之謂可吐也慄悍者按而收之謂按摩也臟寒虛奪者治以灸炳脉病攣痺者治以針刺血實蓄結腫熱者治以砭石氣滯癢厥寒熱者治以導引經絡不通病生於不仁

者治以醪醴血氣凝泣病生於筋脈者治以熨藥始焉求其受病之本終焉蠲其為病之邪者無出於此也昔者黃帝坐於明堂受業於岐伯傳道於雷公曰陰陽者天地之道也綱紀萬物變化殺生蓋有不測之神幹旋宰制於其間病既本於此為工者奚可他求哉又曰有者求之無者求之此求病機之說與夫必求其本之理一也

○雜治賦

纂在齋及編註
病機藥性等書

百病難逃乎八要經曰病有八要不知其要病將安去表裏寒熱虛實邪正而已治病必遵乎三法新病去邪大劑猛治稍久去邪養正寬猛兼治久病藥必平和寬治緩治正氣在人

陽為表而陰為裏上古名言邪氣害人表為陰而裏為陽

仲景妙訣實者脉盛皮熱腹脹前後不通是為五實虛者脉虛

皮寒氣弱泄利少食是為五虛實者得汗便利則活虛者

邪氣凡言虛者皆指新病多寒久病反熱新病正氣壯而

則正氣衰而屬濕熱者多即如外感風寒內傷生冷初

病為寒鬱久則反熱矣惟初病過服涼藥久則為虛內

傷五邪全要調停外感六淫須善汗發五邪正微虛實賊

火風自火出或外感風邪久必屬肝或腎枯肝木妄動血

藥用風寒乃虛尊諸陰為虛經曰邪之所湊其氣必虛暑耗

氣液精神甘酸斂補常投斂汗濕傷皮肉筋骨苦辛汗升

暫咽外濕宜汗忌麻黃乾葛宜羌活蒼朮之類經云土濕

者宜升經云氣升則水降賦云春當散火升陽夏須生脉

益氣枳朮丸草薢丸宜可秋各異其技散厚朴温中湯却堪

冬燥分實虛實燥太便秘而腹脹急宜量體通利虛燥太

火辨補泄外感實火宜分表裏瀉之內傷虛火宜分陰陽

或補陽祛邪猶追盜寇戴尅而恕勞從養正若待小人正

已而無過察邪宜祛除正宜安撫痰不可吐盡火不可降

則劇變也且如傷食積在腸胃瀉滌也自愈停飲塊居經絡

消補兼行口腹縱而濕熱盛燥脾土以復中氣內傷中虛

房勞過而相火動滋腎水以固陰精法當滋陰降火但滋

降過則損陽中氣愈

血無所化則火愈盛而水愈涸矣氣有餘而喘滿痞塞火輕可降其性而

之血不足而吐衄怯癆金分宜清陰虛火動火逼血而妄行故宜清金氣病

調氣而血有依附血病調血而氣無滯凝賦云陽氣為陰血之道引陰血

為陽氣之依歸但調氣之劑如木香官桂我木香附之類以之調血而兩得調血之劑如當歸地黃之類以之調氣

而中張若瘀血滯氣養其血而氣自流行又不可不知調氣必辛涼以散其熱氣屬陽無

形者也陽氣鬱則發熱和血必辛熱以化其形血屬陰有

調以辛涼之藥以散之血積則作痛宜以辛熱之藥以開之至於痰因七情火動治火勿緩痰因火而生者當治

辛熱之藥以開之火為先亦有因痰而生火者痰火火因氣鬱理氣宜增賦云

兩治太繁暴病多火惟病多痰痰因火動治火為先痰有清溫潤燥散之異類熱痰清之

火因氣鬱理氣為本寒痰溫之

燥痰潤之濕痰燥之風痰散之堅者削之客者除之勞者
溫之結者散之留者行之燥者潤之急者緩之散者收之
損者益之勞者逸之驚者平之上者下之下者上之
摩者浴之薄者劫之開者發之皆太法也鬱有達發奪泄
折之殊名木鬱達之吐也蓋肺主收降當居下體今因食
故冷其吐以升達肝木而降肺金○火鬱發之汗也當看
在何經如腰理外鬱則取汗以散之龍火內鬱非苦寒以
降之或用升浮之藥佐以甘溫順其性而從治之使勢極
則止如升陽散火湯是也○土鬱奪之下也邪熱入胃及
中滿腹脹濕熱下痢氣實者則攻下以奪其勢而使之衰
○金鬱泄之利小便也肺為水源氣鬱腎滿而泄道閉矣
宜清金利氣以疏通之○水鬱折之謂折制其衝逆伐而
剋之也如腫脹水氣淫溢而泄道以塞當實脾土以制水
則泄道達而愈或病勢既旺非上法所能遷制則用瀉水
之藥以伐而剋之或汗或下或汗下並施以平之此治之太體雖
然邪氣久客正氣必損苟不平調正氣使各安其位
復其常於治鬱之餘則猶未足以盡治法之妙鬱久生

痰生火而病愈甚

或鬱氣久而痰火成病或病久而氣血滯鬱鬱氣微則調理甚則究其源而發

散病則耗氣耗血而虛由成陽虛畏外寒而濕熱滯則浮

腫陰虛生內熱而風燥盛則痿羸

氣虛不能外敷故惡外寒血虛不能配氣故生

內熱陽虛生寒寒生濕濕生熱濕熱滯氣則周身浮腫陰

虛生火火生燥燥生風風燥傷筋則痿痺羸瘦凡病氣帶

下亦風之屬故全陽虛真火衰甘溫易於補益陰虛真水

竭為治病要藥

陽虛真火衰甘溫易於補益陰虛真水

之苦寒難以滋榮陰陽兩虛惟補其陽而陰自長氣血俱

病只調其氣而血自寧

血病則不仁而不知痛痒氣病則不用而四肢不運氣血俱病則不

仁不治熱以寒寒之氣壅而火食不入攻寒以熱熱之氣

壅而昏躁即生

治熱病以寒藥因氣壅藥不及行故火食不入治寒病以熱藥因氣壅而熱不及行

故發昏躁也善治者須通其氣脉和順陰陽如服太黃不
通加以熱熨其臍服附子發躁少加童便或冷飲以和陰

寒之不寒者當益心府熱之不熱者宜滋腎經賦云治諸
寒者當益

心陽治諸熱有壽者陽平陰秘無病者火降水升抑又聞
者當滋腎水

男子陽多乎陰宜補陰以配陽女子氣滯于血宜開血而

行氣肥人氣虛多痰豁痰補氣自古傳瘦人血虛有火瀉

火滋陰為定議少壯病淺苦攻標何疑老弱病深苦固本

乃是一痰火濕熱百病開鍵少壯新病燥濕清熱豁痰瀉火
老衰久病攻補兼施氣虛則以四君子湯補氣而兼

燥濕清熱瀉火豁痰血虛則以四物湯補血而兼瀉火
豁痰清熱燥濕

調和小兒純陽無陰不可過治西北風高土燥常苦渴秘

癰疽

宜清熱潤燥調養金水二臟以滋化源不可過用涼藥

東南地卑水濕多患腫

痛瘡痢

腫滿血則消痛利便則減治瘡利便在陰分者忌截治痢下氣雖溺少者忌滲瘡不食者傷食痢能

食者胃熱○東南之人木動火明陽氣易升西北之人水流土旺陰氣易降凡久陰常不足陽常有餘故病氣升者多

膏粱無厭

生食毒多

清熱潤燥是奇方淡泊不堪

損中氣多腫脹

散濕溫寒為妙劑肝病有微甚治有逆從微則逆治

以寒藥治

熱以熱藥治寒此逆其氣以正治使其從順也

甚則從攻

以寒治熱佐以熱藥以熱治寒佐以寒藥此從

其病以反取

令其和調也寒因寒用方而熱則因熱塞因塞用方而通

則因通

塞如腫脹補中通如痢疾宜下○嘗考手足少陰太陽四經標本寒熱不定標寒本熱者宜辛苦大

寒入酒熱服以瀉其熱是亦寒因熱用也本寒標熱者宜辛熱大溫而飲以扶其真陽是亦熱因寒用也手足太

陰主收主藏痞滿室塞或苦寒以瀉其滿或甘溫以助其氣是亦寒因寒用塞因塞用也手足少陽風木禁汗者風自汗禁下者恐損陰禁滌者恐損陽宜辛溫上通天氣順其春升之令是亦通因通用也凡標本相反不順者故立反治之法惟手足陽明厥陰四經不從標本從乎中治蓋厥陰為生化之源其支在少陽陽明為肅殺之司其支在少陰西陰陽之分內經謂其分則氣異也是以手陽明太腸喜熱惡清足陽明胃喜清惡熱足厥陰肝喜潤惡燥手厥陰心胞絡乃胞絡十二經之總不係五行乃坤元一正之士雖主生長喜靜惡燥票乎少陽元氣乃能生育故曰三焦為元氣之父胞絡乃陰血之母是四經好惡不同法不可泥故從中治中非中外中之中乃隨時以取中也

收驚者之神妙醫師之擊瘥
昔有婦宿樓上被驚自後聞響昏倒子和曰驚則傷膽非心疾也乃命坐椅前置一瓮令其下視又令一人擊瓮徐徐驚定經曰驚者平之平常見之必無驚驚者神上越也從下擊瘥使之下

止傷者之痛信軍吏之炒葱
昔有貴客視所以收神也

索金_之瘡藥_果之_遂飲酒_{痛不止}有_{軍吏}取_{新葱}入_{灰火}中_煨劈_開其_間有_湯取_菴搗_爛凡_{十數}易_用熱_葱并_湯經_遠畢_席笑_語尸_厥形_{若死}而_{脉動}如_常者_{百會}一_穴可_灸息_積

氣_{又逆}而_{飲食}如_故者_{導引}一_法收_功不在_胃故_不妨_飲

引_法見_保養_類澹_泄無_定或_發或_止只因_{真水}太_旺宜_{三三}白_湯如_故紙_{五味}字

之_類補_腎為_主嘔_逆不_納飲食_{水漿}莫_非邪_火上_衝宜_參連_{二陳}

降_火噫_藥不_執方_中病_為妙_法無_定體_隨時_取中_自立_主意

黃_連苦_參賦_云多_服反_熱以_苦入_心為_熱邪_火降_而真_水

盛_乾姜_附子_誰知_又飲_遭肉_賦云_附子_乾姜_久飲_反冷_蓋

而_致偏_勝之_愆必_習熟_而招_見化_之害_當本_臟旺_時補_益旺_氣太_甚則_臟氣_偏而_天凡_用藥_不宜_偏勝_而招_見化_之

害故曰藥不具五味不備

四氣雖獲勝益又必暴天真中誤而誤中真機關要識中

有誤者泥古方執常法變已効自以為真而不知其誤也

誤中有真者曾有患額癰久不愈諸醫無効偶被店門打

破血統虛則補而實則瀉統會有宗雜病雖緒多無據惟

即愈得其宗矣昔人謂讀仲景書須得仲景之本意予亦謂遵丹溪

法須有丹溪之心曾要之傷寒熱者則雜病愈加明決雜

症熱者則傷寒益以渾融後治內雜病從內之外法當先

治內而後治外至於中外俱傷治法一也傷寒不離乎表

雜病不離乎裏表則汗裏則下中則和劑有輕重緩急之

殊耳後此分科而醫道支離既不能融會貫通又何以隨機應變而救人於危亡之際耶

醫道一貫制

作原於先聖後學時思不可自恃其聰

治法終

○習醫規格

隆慶辛未冬盧子建和何子明善李子星姪時思相聚一堂而請曰入門書已成帙可無規格以習之乎予曰醫司人命非資實而無偽性靜而有恒真知陰功之趣者未可輕易以習醫志既立矣却可商量用工每早對先天圖靜坐玩讀孝經論語小學大有資力者次及全部四書古易白文及書經洪範無逸堯典（理會太意不必強記）蓋醫出於儒非讀書明理終是庸俗昏昧不能踈通變化每午將入門大字從頭至尾逐段誦讀必一字不遺若出諸口（如欲專小科則亦不可不）

讀大科欲專外科亦不可不讀內科蓋因此識彼則有之
未有通於彼而塞於此者惟經涉錢深生熟故有分科不
同熟讀後潛思默想究竟其間意義稍有疑難檢閱古今
名家方書以廣聞見或就有德高明之士委曲請問陶節
庵云但不與俗人言耳蓋方藥而外於本草理趣而外於
素難及張劉李朱縱有小方捷法終不是大家數慎不可
爲其誣惑入門書既融會貫通而後可成一小醫愈加靜
坐玩讀儒書稍知陰陽消長以已驗入由親及疎自料作
車於室天下金轍然後可以應人之求及其行持尤不可
無定規每五鼓清心靜坐及早起仍玩儒書一二以雪心

源時時不失平及其為人診視先問症起何日從頭至足

照依傷寒初症雜症及內外傷辨法逐一詳問症雖重而

門類明白者不須診脉亦可議方症雖輕而題目未定者

必須仔細察脉男必先左後右女必先右後左所以順陰陽升降也先單看以知各

經隱曲次總着以決虛實死生既診後對病家言必以實

或虛或實可治易治難治說出幾分症候以驗自己精神

如有察未及者直令說明不可牽強文飾務宜從容擬議

不可急迫邀切以致恐嚇如診婦女須託其至親先問症

色與舌及所飲食然後隨其所便或症重而就床隔帳診

之或症輕而就門隔帷診之亦必以薄紗罩手貧家不便醫者自袖

薄紗寡婦室女愈加敬謹此非小節及其論病須明白開論

辨折斷其為內傷外感或屬雜病或屬陰虛或內傷而兼

外感幾分或外感而兼內傷幾分論方據脈下所定不可

少有隱秘依古成法參酌時宜年紀與所履順逆及曾服

某藥否女子人經水胎產男子房室勞逸雖本於古而不泥於古真如見其

臟腑然後此心無疑於人亦不枉誤用藥之際尤宜仔細

某經病以某藥為君某為監制某為引使凡劑料本當出自醫家度乎新陳炮

炙一一合則况緊急丸散豈病家所能卒辦但有病家必

欲自製者聽其意向。依本草註。下古法修合。不可逞巧。以傷藥力。病機稍有疑滯。而藥不甚効者。姑待五鼓靜坐。潛心推究其源。再爲診察。改方必無不愈。治病旣愈。亦醫家分內事也。縱守清素。藉此治生。亦不可過取重索。但當聽其所酬。如病家亦貧。一毫不取。尤見其仁。且庶也。蓋人不能報天。必報之。如是而立心。而術有不明不行者。哉。明善又進而言曰。先生之教悉矣。但不識某等業。可以成歟。否。曰。子皆敗家業。儒又多精明警敏。他日大有所悟。煩將素問本草并東垣十書劉河間原病式刪繁校正更類四

方賢哲將前經書本草合爲醫學大全古今方論悉皆附
入或作箋註然後醫書儒籍並明於

昭代亦不負爲中土之人也明善曰有見而後可以著書
小子能知入門足矣曰入門不過捷徑之類耳况集書與
著書不同如張劉李朱發前人未發乃獨得之見真可變
而可傳也若其所集不過古人陳言而類次之耳放下筆
墨已不識其中意義者有之若任爲已見冒負虛名深可
慚懼况病骨稜層未嘗見諸躬行惟一念好生欲與同志
共守內外門戶不至差謬太甚耳若必欲知之真而行之

熟惟子與盧友尚其勉之盧子又進而言曰諄チン實弱且鈍ニ
敢テ丐ニ一言爲約曰不欺而已矣讀入門書而不從頭至尾ニ
靈精熟得一方一論而便謂能醫者欺也熟讀而不思悟ニ
融會貫通者欺也悟後而不早起靜坐調息以爲診視之ニ
地者欺也診脉而不以實告者欺也論方用藥療草而不ニ
精詳者欺也病愈後而希望貪求不脫市井風味者欺也ニ
蓋不患醫之無利ニ特患醫之不明耳ニ屢用屢驗而心有所得不纂集以補報ニ
天地公於人人者亦欺也欺則良知日以蔽塞而醫道終ニ
失不欺則良知日益發揚而醫道愈昌欺不欺之間非人ニ

之所能與也明善乃相率而拜曰敢不矢心立志以承先生之德教哉於是袖盧子錄稿之半以歸于建寧而託時思繪寫校正將以傳於通家楊子幹子柱余子名龍李子矩并親友之相信者云時壬申仲春稿也
萬曆乙亥仲春初吉南豐邑東李挺謹書

門人族姪李

聰校寫

門人

盧大誥
姜湖

劉學堯
鄒梅贈

李春魁
楊文輝

鄧孔泗
刻

編註醫學入門外集卷之七終

寬永壬午仲秋

村上平樂寺開板

